

## BILAN DES DECOUVERTES INTERESSANTES DE L'ANNEE 2000

### COTES D'ARMOR

Liste rédigée par Laurent POUX, Daniel PHILIPPON, et Rémy PRELLI

*Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le département :*

- *Aceras anthropophorum* : Sables d'Or-Les Pins, près de la chapelle (B.L., F.S.). Espèce nouvelle pour les Côtes d'Armor.
- *Anogramma leptophylla* : Pleubian, talus au S de Kernod et route de Kermagen (D.P.) ; Ker Yvon à Lannion (D.P.).
- *Avenula pubescens* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Centaureum scilloides* : Lohuec, ancienne voie romaine-Toull al lann (S.G.) ; Loguivy, forêt de Beffou (T.C.).
- *Cynosurus echinatus* : St-Quay-Portrieux, île de la Comtesse (V.D., 1999).
- *Deschampsia flexuosa* : Le Leslay, source du Leff (L.P.).
- *Drosera intermedia* : Maël-Pestivien, N du bourg (S.G., 1999) ; Lohuec, Toull al Lann-Botfau et Ty Gwen (S.G., 1999).
- *Drosera rotundifolia* : Maël-Pestivien, N du bourg-vallée du Kerhubet (S.G., 1999) ; Lohuec, N de la D. 28 à l'E de Ty Gwen (S.G., 1999).
- *Dryopteris aemula* : Lanvellec, petit bois près du Roudour (T.C.).
- *Galium neglectum* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Linaria arenaria* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Menyanthes trifoliata* : Cohiniac, bord carrefour D45 et dir. Le Leslay (D.P.).
- *Ornithopus pinnatus* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.) ; Lanmodez, rocher au S du marais de Landoz (D.P.) ; Plouézec, pointe de Minard (V.D.).
- *Platanthera chlorantha* : Pleumeur-Bodou, Ile Grande près de la station ornithologique vers la base nautique (B.L., 1999 et 2000).
- *Pseudarrhenatherum longifolium* : revu à Plestin-les-Grèves, Grand Rocher et plus au N dans la forêt (R.R.).
- *Rhynchospora alba* : Lohuec, E de Ty Gwen près de la D28 (S.G, J.D., 1999).

- *Rumex maritimus* : limite Lanrelas et Plumaugat, étang de Loziers (D.C.).
- *Rumex rupestris* : Lancieux, plage St Sieux (V.D.); Erquy, E de la plage du Lourtuais (V.D.).
- *Sagina nodosa* : Pleumeur-Bodou, Ile Grande (R.R.).
- *Saxifraga granulata* : Erquy, la Fosse Eyrand (B.L.).
- *Solanum dulcamara marinum* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Torilis nodosa* : Erquy, plage du Lourtuais (R.P.).
- *Trichomanes speciosum* (gamétophyte) : Plougrescant, grande île d'Er (P.H.).
- *Utricularia minor* : Saint Norgant-Kerbalen, étang du Blavet (C.G., L.P.).
- *Zostera noltii* : Bréhat, plage du Gerzido (L.P., 1999).

### *Autres espèces intéressantes pour le département :*

- *Aegopodium podagraria* : Quintin, Bord du Gouët (L.P.).
- *Allium sphaerocephalon* : Trébeurden, près du marais de Quellen (B.L.).
- *Anthemis cotula* : La Chèze, route des Noës vers St Etienne du Gué de l'Isle (J.P.); Ploufragan, vallée entre Calfort et la Ville au Beau (V.D.).
- *Apium inundatum* : Saint Norgant-Kerbalen, étang du Blavet (C.G.); St Donan, Forville (C.G.).
- *Arrhenatherum elatius subsp. elatius* : Plouézec, pointe de Plouézec (V.D.).
- *Atriplex laciniata* : Saint Michel-en-Grève et Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Briza maxima* : Pleumeur-Bodou, dune de Landrellec (B.L., 1999).
- *Buxus sempervirens* : Loguivy-Plougras, Coat Meur (T.C.).
- *Calamintha sylvatica subsp. ascendens* : Plérin, chemin S de la pointe du Roselier (V.D.).
- *Callitriche hamulata* : Plouguernevel, Rau Doré entre Stang Riel et Kerroc'h (P.L.M.).
- *Caltha palustris* : Callac-St Servais, vallée du Pont Hellou (S.G.); Plourac'h, vallée du Guérichard (S.G., 1999).
- *Carex pallescens* : Loguivy-Plougras, SO de la forêt de Beffou (T.C.).
- *Chenopodium rubrum* : Lanmodez, bord de grève près de Min Rez (D.P.).
- *Cicendia filiformis* : Boqueho, E du bois Meur (D.P., R.P.); St Donan, le Bout de Ville (C.G.).
- *Cirsium oleraceum* : Plourhan, la Ville Morel (G.&C. M.). Espèce nouvelle pour les Côtes d'Armor (Mabille non cité; Lloyd idem; des Abbayes idem).
- *Cornus sanguinea* : Loguivy-Plougras (O du département), forêt de Beffou (T.C.).
- *Corydalis lutea* : Chatelaudren, vieux murs (G.&C. M., 1999 et 2000); Plourhan, St Barnabé (G.&C. M., 1999 et 2000).
- *Festuca gigantea* : Plouzelambre, vallée du Roscoat au moulin du Roudour (D.P.).
- *Hirschfeldia incana* : Pleumeur-Bodou, assez abondant île Aganton (D.P.).
- *Jasione montana var. maritima* : Penvenan, île du Château (D.P.).
- *Lamium album* : Plourhan, la Ville Morel (G.&C. M.).
- *Littorella uniflora* : Kerbalen, étang du Blavet-Moulin du Blavet (C.G., J.P.); Canihuel, étang de Pelinec (J.P.).
- *Luronium natans* : St Donan, Forville (C.G.).
- *Matthiola sinuata* : St Michel-en-Grève, sur dune embryonnaire (D.P.); revu Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Mibora minima* : Bréhat, Crec'h Esquern (J.G., 1999).
- *Nymphoides peltata* : Canihuel, revu étang de Pelinec et noté en extension (J.P.).
- *Poa cf. subcoerulea* : Plougrescant, île des Pins (D.P.).
- *Potentilla anglica* : St Gouéno, le Placis (V.D.); St-Brieuc, Carfort (V.D.).

- *Sagina apetala subsp. apetala* : Plérin, Tournemine (L.P.).
- *Sagina subulata* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Senecio vulgaris subsp. denticulatus* : Trélévern, arrière plage (B.L.).
- *Silybum marianum* : Pléguen, vers la Boissière (G.&C. M.) ; revu Binic, la Rognouse et sentier littoral (G.&C. M., 1999).
- *Ruppia maritima* : Penvenan, île St Gildas (P.L.M.).
- *Symphytum tuberosum* : Loguivy-Plougras, O de la forêt de Beffou (T.C., 1999).
- *Tetragonia tetragonoides* : Ploubazlanec, O de Porz Don (D.P.).
- *Torilis arvensis* : présent en WU75, localité non précisée (sortie GEPN).
- *Trifolium ornithopodioides* : Lanmodez, rocher au Sud du marais de Lanroz (D.P.).
- *Tuberaria guttata* : Boquého, E du bois Meur - la Boulaie (D.P.).
- *Ulex europaeus var. maritimus* : Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Veronica agrestis* : St Gouéno, le gué Norme (V.D.).
- *Vicia lathyroides* : revu à Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *Vicia lutea* : Lanmodez, îlot au S de l'île Coalen (D.P.).
- *Viola canina* : Perros-Guirec, centre-ville (P.L.M.).
- *Viola kitaibeliana* : revu Pleumeur-Bodou, île Aganton (D.P.).
- *X Anacamptorchis laniccae* : Pleumeur-Bodou, Landrellec [3 pieds] (B.L., F.S.).

**Observations de :** D.C. : Daniel Chicouëne, T.C. : Thierry Coïc, V.D. : Vianney Dalibard, J.D. : José Durfort, C.G. : Colette Gautier, J.G. : Johan Gourvil, S.G. : Stéphane Guérin, P.H. : Patrick Hamon, P.L.M. : Patrick Le Mao, B.L. : Brigitte Lorella, G.&C. M. : G.&C. Meunier, J.P. : Jacques Petit, D.P. : Daniel Philippon, L.P. : Laurent Poux, R.P. : Rémy Prelli, R.R. : Rémy Ragot, F.S. : François Seité.

---

## FINISTERE

Liste rédigée par Franck HARDY et Rémy RAGOT

### *Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le département :*

- *Bupleurum tenuissimum* : plage de Kerdalé à Trégunc (R.R.).
- *Butomus umbellatus* : étang Grouinet à Pouldreuzic (revu R.R., 1998-2000).
- *Carex punctata* : plage du Cleut Rouz à Fouesnant (R.R.), commune sur laquelle il avait déjà été signalé (G.B., Mousterlin, 1993) ; côte entre Rospico et Port Manec'h à Névez (R.R.).
- *Centaurea scabiosa* : sentier côtier Raguenez-Port Manec'h à Névez (F.Z., M.B.Z.).
- *Centaureum maritimum* : côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.).
- *Cynoglossum officinale* : revu plage de Guendrez à Plozévet (coll., sortie E.R.I.C.A.).
- *Elatine hexandra* : étang de Brézal à Plounéventer (F.H., P.A.), Loc'h Louargar-stang Montfort à Trégunc (R.R.).
- *Exaculum pusillum* : deux stations en Presqu'île de Crozon signalées par H.M., dans les environs de l'ancienne mine située au SE de Tromel (H.M., 1994), entre la plage du Poul et Kervoanné (H.M., 1994), ce qui porte à quatre le nombre de stations actuellement connues dans le Finistère.

- *Filipendula vulgaris* : S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998).
- *Galium parisiense* : rive du Ster face à Lesconil en Plobannalec (R.R.). Taxon qui était déjà mentionné dans cette commune (R.R., 1996).
- *Hippuris vulgaris* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, R.R. ; station signalée antérieurement par N.A. et S.M., 1995).
- *Huperzia selago* : un pied dans une tourbière à Plounéour-Ménez (J.D., A.S.). Quatrième station Finistérienne et du grand ouest français actuellement connue. Une situation en tourbière n'avait pas été relevée depuis le Vergam à Scignac où Rémy Prelli avait observé l'espèce en 1980 ; station non retrouvée depuis (J.D., comm. perso.).
- *Lathyrus japonicus subsp. maritimus* : Beg Meil à Fouesnant (R.R.). Première observation dans le sud-Finistère.
- *Lathyrus sylvestris* : moulin de Trobodeg à Guimaëc (P.H.).
- *Legousia hybrida* : revu plage de Guendrez à Plozévet (coll., sortie E.R.I.C.A.). Identification qui reste cependant à confirmer en raison d'une confusion possible avec *L. speculum-veneris*.
- *Liparis loeselii subsp. loeselii* : dunes de Tréompan à Ploudalmézeau (J.C., P.G., C.M., L.C.), nouvelle station à Plomeur (J.C., B.B.).
- *Lithospermum officinale* : Kerglouanou à Moëlan-sur-Mer (P.M.).
- *Lotus parviflorus* : pointe de Kermorvan au Conquet (E.Q.), avec dans le même secteur *Isoetes hystrix*, *Ophioglossum lusitanicum*, *Scilla verna* et *Cochlearia officinalis* (revus, E.Q.). Taxon également connu dans les environs de Brest et de Plougastel-Daoulas.
- *Myosotis sicula* : rive du Ster face à Lesconil à Plobannalec (R.R.). Deuxième station actuellement connue.
- *Ononis reclinata* : pointe-chapelle de Beg-Pol à Brignogan-Plage (F.H.).
- *Ophrys fusca* : étang de Kerloc'h à Crozon (F.S.). Nouveauté pour le Finistère.
- *Orchis coriophora* : rive du Ster face à Lesconil à Plobannalec (revu, R.R.).
- *Platanthera chlorantha* : les Sables Blancs à Locquirec (V.D.).
- *Polygonum oxyspermum subsp. raii* : plages de Kerdalé et de Kerouiny à Trégunc (R.R.), Loc'h Louargar-stang Montfort à Trégunc (R.R.). Trois stations désormais connues dans le Finistère après la découverte de ce taxon à Crozon en 1999 (F.B.).
- *Polystichum aculeatum* : bois de Trogoff à Plouégat-Moysan (T.C., id. confirmée par R. Prelli). Quatrième station Finistérienne actuellement connue.
- *Puccinellia fasciculata* : prairie et marais saumâtres pâturés au SO de l'anse de Goulven (F.H., E.Q., M.H., à confirmer), Louc'h an Dreff à Kerlouan (F.H., à confirmer), camping de la pointe de Beg Pol à Brignogan-Plage (F.H., à confirmer), étang du Kermor-plage du Tevenn à l'île Tudy-Combrit (revu, R.R. ; observation antérieure en 1996, R.R.).
- *Ranunculus nemorosus* : N de Keranhor à Lanmeur (Y.L.G., 1999).
- *Ranunculus ophioglossifolius* : deux stations au Loc'h à Landévennec, près de l'étang et en forêt domaniale (M.T.T.), ce qui porterait à quatre le nombre de stations actuellement connues dans le département.
- *Senecio helenitis* : côte au N de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 1999), Kervary-Kernévez à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 1999), les Sables Blancs à Locquirec (revu, V.D.).
- *Triglochin palustris* : dépressions humides des dunes du Vougot à Guissény (E.Q.), Lestevenn à Ploudalmézeau (F.H., E.Q.), étang de Trunvel à Tréogat (R.R., 1998-2000), côte entre l'île Percée et Brigneau à Moëlan-sur-mer (R.R.). Au moins six stations désormais connues dans le Finistère.

### Taxons de la Liste Rouge armoricaine peu courants dans le département :

- *Asplenium obovatum subsp. obovatum* : pointe du Millier à Beuzec Cap Sizun (cinq stations, R.R.)-taxon qui était déjà connu dans le secteur ; Porz Enn à Plogoff (R.R.) ; Roches blanches et sentier côtier à Tréboul (R.R.).
- *Atriplex littoralis* : plage de Kerdalé à Trégunc (R.R.), E de l'anse de Goulven (F.H., à confirmer), Loc'h Louriec à Trégunc (R.R.), étang et palue Grouinet à Pouldreuzic (R.R., 1998-2000), côte entre l'île Percée et Brigneau à Moëlan-sur-mer (R.R.), côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.), Saint-Pierre à Penmarc'h (R.R.).
- *Cytisus scoparius subsp. maritimus* : pointe de Penquernéo à Riec-sur-Belon (F.H.).
- *Centaurium scilloides* : les Sables Blancs à Locquirec (revu, V.D.).
- *Equisetum telmateia* : côte au N de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 1999), N du moulin de Fonteyou à Gourlizon (R.R.), NE de Bel-Air à Plounevénter (Ph.H.).
- *Lycopodiella inundata* : Toul ar Broc'hed à Botmeur (J.D.).
- *Orchis laxiflora subsp. palustris* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, R.R.).
- *Ornithopus pinnatus* : deux stations en bordure de route au S de Kervoulou à Plouarzel (F.H.), pelouse au SE de Traonigou à Porspoder (F.H.), Ty Colo sur le bord de la D5 à Guilers (C.B., F.H.), gare au S de Saint-Pol-de-Léon (F.H.), pointe de Kermorvan au Conquet (E.Q.).
- *Polygonum maritimum* : Loc'h Louriec à Trégunc (revu, R.R.), étang et palue Grouinet à Pouldreuzic (revu R.R., 1998-2000).
- *Pseudarrhenatherum longifolium* : lande en face de Roc'h ar Hézec à Brennilis (J.D.).
- *Serapias parviflora* : dunes de Tréompan-Tévenn à Ploudalmézeau (C.C.), Plomeur (B.T., M.T.T.), dunes de Keremma à Tréfleze (M.T.T., J.F.G., sortie E.R.I.C.A.). Ce taxon compterait à présent au moins dix stations dans le Finistère.
- *Spiranthes aestivalis* : nouvelle station à Plomeur (J.C.).

### Autres taxons intéressants à noter :

- *Allium ampeloprasum* : pyrotechnie de St-Nicolas à Guipavas (Y.G.).
- *Alopecurus bulbosus* : étang du Kermor-plage du Tevenn à l'île Tudy-Combrit (revu, R.R.).
- *Alopecurus myosuroides* : Kersaux-Kergos à Tréguennec (R.R., 1998).
- *Anthemis arvensis* : étang du Mur à Saint-Evarzec (R.R.).
- *Aristolochia clematitidis* : Porz Lamat à Moëlan-sur-mer (Y.G.).
- *Asplenium ruta-muraria* : bourg de Locronan (revu D.C.), côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.), bourg de Plouescat (P.A., F.H., C.B.).
- *Avena strigosa* : bord de culture au N de Croaz Edern à Plouguerneau (F.H., C.B., à confirmer).
- *Bidens frondosa* : Loc'h Louriec à Trégunc (R.R.).
- *Briza maxima* : Kergoz à Clohars-Fouesnant (R.R.), Bodillo à Pont-l'Abbé (R.R., 1998).
- *Bromus madritensis* : murs de Doëlan à Clohars-Carnoët (Y.G.).
- *Calendula arvensis* : plage du Tevenn (bord du parking) à l'île Tudy (R.R.).
- *Caltha palustris* : vallée de l'Aulne entre Hilgarz et Kernon à Bolazec (F.H.).
- *Calystegia sylvatica* : entre Kerret et Kermadien à Bolazec (F.H.), O de Quélouarn à Plouigneau (F.H.).

- *Cardaria draba* : gare de Pont-l'Abbé (R.R., 1998).
- *Carex acuta* : rive droite du Jet entre Kerampensal et Keriou à Ergué-Gabéric (R.R.), côte entre Doëlan et la rivière de Merrien (R.R.).
- *Carex caryophylla* : Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.) rive gauche de l'Odet à Gouesnac'h (R.R.), côte entre Rospico et Port Manec'h à Névez (R.R.), pointe de Penquernéo-Trémellour à Riec-sur-Belon (coll., sortie E.R.I.C.A.).
- *Carex elata* : Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.).
- *Carex pallescens* : vallée de l'Aulne entre Hilgarz et Kernon à Bolazec (F.H.), rive gauche du Douron en aval de la N12 à Plouigneau (J.D., 1996).
- *Carex pseudocyperus* : dépressions humides des dunes du Vougot à Guissény (E.Q.), moulin du Jet à Ergué-Gabéric (R.R.), Kerandraon-Cosquer à Saint-Evarzec (R.R.), Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.), moulin du Lenn-Lannaouen-D34 à Clohars-Fouesnant (R.R.), étang et palue Grouinet à Pouldreuzic (R.R., 1998-2000).
- *Carex serotina* : Marais du Curnic à Guissény (F.H., à confirmer), S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998).
- *Centaurea aspera* : dunes de Tréompan à Ploudalmézeau (P.H., 1999).
- *Chaenorhinum minus* : dans un chemin sableux près de Kermoné Braz à Plounéour-Trez (F.H.).
- *Chenopodium botryoides* : plage de Kerdalé à Trégunc (R.R.).
- *Chenopodium glaucum* : O de La Gare à Plounéour-Trez (F.H., id. confirmée par Louis Diard), Kerscao à Plouescat (T.C., L.G., F.H., sortie E.R.I.C.A.).
- *Chenopodium hybridum* : O de La Gare à Plounéour-Trez (F.H.).
- *Chenopodium vulvaria* : Kervroagué à Plomeur (R.R., 1997-2000).
- *Daphne laureola* : entre le Dourduff-en-Mer et le Dourduff-en-Terre à Plouézoc'h (P.H.), Traon-Teucher à Plouézoc'h (Y.L.G.), la Villeneuve-Braouic à Quimperlé (R.R., D.Ch.).
- *Dittrichia graveolens* : carrière de Kelareun-Kervac'h à Treffiat (R.R.), champs à Treffiat (R.R.).
- *Duchesnea indica* : Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.).
- *Echium vulgare* : Saint-Pierre à Penmarc'h (R.R.).
- *Eleocharis uniglumis* : E de la grève de Goulven-dunes de Keremma à Goulven-Tréflez (coll., sortie E.R.I.C.A.), SO de l'anse de Goulven (F.H., E.Q., M.H.).
- *Ephedra distachya* : côte entre Kersidan et Kerascoët à Névez (R.R.).
- *Erodium maritimum* : côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.).
- *Euphorbia exigua* : étang et palue Grouinet à Pouldreuzic (R.R., 1998-2000), S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998).
- *Euphorbia lathyris* : Kergusuel-Kergroaz à Bodilis (P.H.), vallée du Guillec (St-Jacques / Dourduff) à Plougoulm (F.H., C.B., P.A.), E de l'anse de Goulven (F.H., E.Q., P.A.), Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.).
- *Galinsoga ciliata* : SO de La Gare à Plounéour-Trez (F.H.).
- *Galium uliginosum* : vallée de l'Aulne entre Hilgarz et Kernon à Bolazec (F.H.).
- *Galium verum* : Poulgoazec-Roz Lezarouen à Plouhinec (R.R.).
- *Gnaphalium luteo-album* : Keramily à Plounevez-Lochrist (T.C., L.G., F.H., sortie E.R.I.C.A.).
- *Hieracium sabaudum* : Ty Ru-Quillidien à Plouigneau (F.H.), Prat-Marjily-Kerhuon à Plouigneau (F.H.), tumulus de Porz-Meur à Plouégat-Guérand (F.H.), bois du Nivot à Lopérec (G.R.), O du Nivot à Lopérec (G.R.).

- *Hyosciamus niger* : maison des dunes de Trévignon à Trégunc (R.R.).
- *Hypericum linariifolium* : Bodillo à Pont-l'Abbé (revu R.R., 1998), côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.).
- *Inula conyza* : côte entre Rospico et Port Manec'h à Névez (R.R.).
- *Juncus subnodulosus* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu R.R.).
- *Lathyrus aphaca* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu R.R.).
- *Lathyrus hirsutus* : marais de Lescors à Penmarc'h (R.R.).
- *Lathyrus nissolia* : marais de Lescors à Penmarc'h (R.R.).
- *Lemna gibba* : le Cleun à Trégunc (P.H.), marais de Lescors à Penmarc'h (R.R.), Saint-Pierre à Penmarc'h (R.R.).
- *Lemna minus* : marais de Lescors à Penmarc'h (R.R.).
- *Lemna trisulca* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu R.R.).
- *Logfia gallica* : Toulbroc'h à Plouzané (L.G.), parking du Parc des Expositions à Brest (R.R., 1998).
- *Lotus tenuis* : S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998), marais de Lescors à Penmarc'h (R.R.).
- *Ludwigia palustris* : étang du Mur à Saint-Evarzec (R.R.).
- *Ludwigia uruguayensis* : Loc'h Louargar-stang Montfort à Trégunc (R.R.). Espèce invasive.
- *Lysimachia nummularia* : bordure S de l'étang du Moulin Neuf à Plouarzel (F.H.), stang Odet à Ergué-Gabéric (R.R.), étang du Mur à Saint-Evarzec (R.R.).
- *Mycelis muralis* : O du Nivot à Lopérec (G.R.).
- *Oenanthe aquatica* : sources du Kerloc'h au SE de Hircars à Crozon (M.T.T.).
- *Petroselinum crispum* : Kersaux-Kergos à Tréguennec (R.R., 1998), Poulgoazec-Roz Lezarouen à Plouhinec (R.R.).
- *Petroselinum segetum* : S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998), Kersaux-Kergos à Tréguennec (R.R., 1998).
- *Picris hieracioides* : Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.), Beg Meil à Fouesnant (R.R.), étang du Kermor-plage du Tevenn à l'île Tudy-Combrit (R.R.).
- *Pimpinella saxifraga* : dunes de Kerbrat-pointe de Théven à Plougoulm (F.H., C.B.), ainsi qu'*Helichrysum stoechas* (revu, F.H., C.B.) qui atteint ici sa limite N selon des Abbayes et al. (1971) ; S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998) ; Lilia (pointe St Cava) à Plouguerneau (R.R.).
- *Poa nemoralis* : entre Larlac'h Izella et Kerdilès à Plouédern (P.H.).
- *Polypogon viridis* : Poulgoazec-Roz Lezarouen à Plouhinec (R.R.).
- *Potamogeton pectinatus* : fossé au S de l'étang de Ty Colo à Saint-Renan (F.H.), étang et palue Grouinet à Pouldreuzic (R.R., 1998-2000).
- *Potentilla anglica* : Cheffontaine-Saint-Thomas à Clohars-Fouesnant / Pleuven (R.R.).
- *Ranunculus ficaria* subsp. *bulbosus* : Ty Pistel à Lanmeur (Y.L.G.).
- *Ranunculus paludosus* : plage de Guendrez à Plozévet (revu coll., sortie E.R.I.C.A.), S de l'étang de Kergalan (Pencleuz-Kerbinigou) à Tréogat (R.R., 1998), rive du Ster en face Lesconil à Plobannalec (R.R.).
- *Reseda lutea* : marais de Toul-an-Dour à Landéda (P.T.).
- *Rosa micrantha* : bois du Nivot à Lopérec (G.R.).
- *Ruppia cirrhosa* : étang du Kermor-plage du Tevenn à l'île Tudy-Combrit (R.R.).

- *Sagina subulata* : NO de Kervranton entre la D42 et l'ancienne carrière à Guerlesquin (V.D.), rive du Ster face à Lesconil à Plobannalec (R.R.).
- *Salicornia ramosissima* : marais de Toul-an-Dour à Landéda (P.T., id. confirmée par Ch. Lahondère), plage du Cleut Rouz à Fouesnant (R.R.), étang du Kermor-plage du Tevenn à l'Île Tudy-Combrit (R.R.).
- *Sambucus ebulus* : Kersaux-Kergos à Tréguennec (R.R., 1998).
- *Scabiosa atropurpurea* : Beg Meil à Fouesnant (R.R.), Saint-Pierre à Penmarc'h (R.R.).
- *Scirpus sylvaticus* : vallée de l'Aulne entre Hilgarz et Kernon à Bolazec (F.H.).
- *Scleranthus annuus* : Milin Hus-Kerbignon à Lanneuffret / Saint-Servais (P.H.).
- *Serratula tinctoria* : Bord de la route de Sizun en Lopérec (G.R., 1999).
- *Silene nutans* : Kergoz à Clohars-Fouesnant (R.R.), Lanhuron à Gouesnac'h (R.R.).
- *Silybum marianum* : Kergarec (bord des falaises) à Saint-Jean-du-Doigt (P.H.), marais de Toul-an-Dour à Landéda (P.T.), Menez-Ham à Kerlouan (F.H.).
- *Sison amomum* : Beg Meil à Fouesnant (R.R.), côte entre Brigneau et la rivière de Merrien à Moëlan-sur-mer (R.R.).
- *Symphytum tuberosum* : côte au N de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 1999); forêt de Fréau (R.R., sortie E.R.I.C.A.).
- *Trifolium glomeratum* : Landunvez (F.H.).
- *Trifolium resupinatum* : Kervary-Kernévez à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 1999), rive du Ster en face Lesconil à Plobannalec (R.R.).
- *Trifolium squamosum* : SO de l'anse de Goulven (E.Q., F.H., M.H.), Plonéis (R.R.), Boutanec à Pont-de-Buis (R.R., 1998), Quivit à Châteaulin (R.R.).
- *Trifolium striatum* : Landunvez (F.H.).
- *Trifolium suffocatum* : presqu'île Sainte-Marguerite à Landéda (F.H.).
- *Utricularia australis* : étang de Trunvel à Tréogat (R.R., 1998-2000).
- *Valerianella eriocarpa* : plage de Guendrez à Plozévet (coll., sortie E.R.I.C.A.).
- *Valerianella rimosa* : Garz an Hore à Plounévezel (V.D.).
- *Verbascum virgatum* : moulin du Jet à Ergué-Gabéric (R.R.), Le Carpont à Gouesnac'h (R.R.), gare de Pont-l'Abbé (R.R., 1998).
- *Vicia bithynica* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu R.R.).
- *Vicia sepium* : Plougouvelin (L.G.), sous-bois de la vallée de l'Horn (Ty Korn) à Plougoulm (F.H., C.B.), stang Odet à Ergué-Gabéric (R.R.), rive gauche de l'Odet à Gouesnac'h (R.R.).

**Observations de :** N.A. : Nicole Annezo, P.A. : Pauline Ansquer, B.B. : Bruno Bargain, F.B. : Frédéric Bioret, C.B. : Christophe Bougault, M.B.Z. : Monique Bourgoïn-Zanré, G.B. : Gilles Bretagne, D.C. : Dominique Chagneau, D.Ch. : Daniel Chicouëne, J.C. : Jacques Citoleux, T.C. : Thierry Coïc, C.C. : Claude Colin, L.C. : Loïc Créac'h, V.D. : Vianney Dalibard, J.D. : José Durfort, L.G. : Laurent Gager, P.G. : Pascal Gautier, J.F.G. : Jean-François Glinec, Y.G. : Yvon Guillevic, Ph. H. : Philippe Hamonou, P.H. : Patrick Hamon, M.H. : Marion Hardegen, F.H. : Franck Hardy, Y.L.G., Yves Le Gall, S.M. : Sylvie Magnanon, C.M. : Cécilia Malherbe, P.M. : Paul Mauguin, H.M. : Henri Michaud, E.Q. : Emmanuel Quéré, R.R. : Rémy Ragot, G.R. : Gabriel Rivière, F.S. : François Seité, A.S. : Agnès Stéphan, P.T. : Philippe Thévenin, M.T.T. : Marie-Thérèse Thierry, B.T. : Bernard Trébern, F.Z. : Francis Zanré.



---

**ILLE-ET-VILAINE**


---

Liste rédigée par Louis DIARD

**Taxons de la Liste Rouge armoricaine :**

- *Agrimonia procera* : la Belle-étoile à Bagger-Pican (LD), Monlieu à Roz-sur-Couesnon (PT).
- *Butomus umbellatus* : la Basse-Groussinai à Ste-Marie (CF), étang de Bazouges-sous-Hédé (CP).
- *Cardamina parviflora* : peupleraie en bordure de l'Aff à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Catabrosa aquatica* : landes de Jaunousse à Billé (LD).
- *Coeloglossum viride* : la Sablière en St-Coulomb (DM).
- *Coleanthus subtilis* : étang de comper à Paimpont (CF-LD-GR-PT), étang de Belouze à Baulon (PT).
- *Convallaria majalis* : bois de la Chalopinai à Pancé, le Bois Patin à Saulnières (LD), bois de la Feutelais à Tresboeuf (LD-PT), bois de Champaufour à Thorigné-Fouillard (FP).
- *Crambe maritima* : Château Richeux à St-Mélor-des-Ondes (PLM).
- *Crassula vaillantii* : la Coquinais à St-Anne-sur-Vilaine (BA-HT)
- *Cyperus fuscus* : étang de comper (CF-LD-GR-PT), l'Hébergement à Noyal-Châtillon (PT).
- *Damasonium alisma* : les Prés de Fouy à Ste-Marie (LD).
- *Doronicum plantagineum* : les Bignons à le Sel-de-Bretagne (LD).
- *Drosera intermedia* : le Biardel à Gaël, forêt du Pertre (LD) Pierre Barge à Campel (PT).
- *Drosera rotundifolia* : ruisseau de la Noë à Paimpont (JFC).
- *Elatine hexandra* : étang de Comper à Paimpont (CF-LD-GR-PT), étang de Belouze à Baulon (PT).
- *Eleocharis ovata* : étang de Comper à Paimpont (CF).
- *Epipactis helleborine* : la Rosière à Plerguer, le Chêne Vert à Dol-de-Bretagne, le Grand Clos à Bagger-Morvan (LD), les Petits Vaux à Dingé (SLH), la Motte au Rocher à Québriac (FP).
- *Euphorbia dulcis* : le Moulin du Tertre à Maure-de-Bretagne (PT).
- *Euphorbia platyphylla* : Polder de la Mulotais au Mont-Dol (LD).
- *Exaculum pusillum* : les Landes Blanches à Baulon, l'étang de Comper à Paimpont (LD), la Jarillais à Crevin, la Grée des Landelles et la Forge à Chanteloup, Moulin de la Chaise à Goven (PT).
- *Fritillaria meleagris* : revu forêt de Teillay (GT), bois de la Chouanière à Martigné-Ferchaud (MC).
- *Galanthus nivalis* : Lycastel à Plerguer (LD), Mainténiac à Pléchatel (PT).
- *Galium parisiense* : Corbinière à Messac (BA-HT).
- *Gratiola officinalis* : revu à l'étang de Châtillon-en-Vendelais (YB).
- *Hottonia palustris* : la Belle Etoile à Bagger-Pican (CP), Champeaufour à Thorigné-Fouillard, bord de l'Aff à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Isopyrum thalictroides* : la Frenais à Pléchatel (PT).
- *Juncus pygmaeus* : étang du Pas du Houx à Paimpont (CF).
- *Juniperus communis* : le Plessis-Morvan à Gaël, près de la carrière de Trékoët à Muel (LD), étang de Comper à Paimpont (LD-PT), étang du Pont Dom Jean à Paimpont (PT).
- *Lactuca saligna* : la Gautraie en St-Jacques-de-la-Lande (BA-AG).
- *Legousia speculum-veneris* : gare de Messac (BA-HT).

- *Limosella aquatica* : étang de Comper (LD-CF), les Prés de Fouy à Ste-Marie (CF).
- *Littorella uniflora* : étang de Belouze à Baulon (PT), revu à l'étang de Comper à Paimpont (LD).
- *Luronium natans* : étang de Belouze à Baulon, étang du Pont Dom Jean à Paimpont, les Epinais à Mernel (PT), Carfantin à Dol-de-Bretagne (CP), le Moulin de Sixt-sur-Aff, étang de Comper à Paimpont (LD).
- *Myosurus minimus* : les Prés de Fouy à Ste-Marie (PT-LD).
- *Najas marina* : l'Etang Neuf à Québriac (LD-RR).
- *Ophioglossum vulgatum* : la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (GP-CD), le Bois Patin à Saulnières (LD-PT).
- *Ophrys apifera* : le Callouët à Bruz (FP), la sablonnière à St-Coulomb (PLM).
- *Ophrys sphegodes* : la Sablonnière à St-Coulomb (PLM).
- *Ornithogalum pyrenaicum* : la Caltais à Bourg-des-Comptes, la Frenais et Mainténiac à Pléchatel, la Jaunais à Poligné, la Chatière à Le Sel-de-Bretagne (PT), la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (AM-LD).
- *Otanthus maritimus* : Anse Du Guesclin à St-Coulomb (AG) - *nouveau pour l'Ille-et-Vilaine*.
- *Paris quadrifolia* : forêt de Rennes à Liffré (MM).
- *Pilularia globulifera* : Trégaret à Sixt-sur-Aff (LD), Bouyère à St-Erblon, la Forge à Chanteloup, le Terre Pérou à St-Malo-de-Phily, la Jarillais à Crevin (PT).
- *Pinguicula lusitanica* : le Biardel à Gaël (LD-PT).
- *Platanthera bifolia* : près de l'étang de Rolin à Quebriac (FP).
- *Pulicaria vulgaris* : les Prés de Fouy à Ste-Marie (LD).
- *Ranunculus nemorosus* : la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (LD).
- *Rumex maritimus* : les Prés de Fouy à Ste-Marie (LD).
- *Scandix pecten-veneris* : gare de Messac (LD).
- *Sedum rubens* : près de la Gare de Dol-de-Bretagne (LD), le Temple du Cerisier à St-Jacques-de-la-Lande (BA-HT), la Ville Betton à Roz-sur-Couesnon (PT).
- *Thalictrum flavum* : revu à la Tresse à Roz-Landrieux (LD).
- *Tordylium maximum* : près des étangs d'Apigné à Rennes (BA).
- *Wolffia arrhiza* : les Prés de Fouy à Ste-Marie (LD), le Moulin Roux à Muel (LD-PT).

#### *Autres taxons intéressants pour le département :*

- *Adoxa moschatellina* : Caharel à Saulnières (PT).
- *Allium roseum* : la Bassière à Cherrueix (LD), la Sablière à St-Coulomb (SM).
- *Ammi majus* : décombres à Rennes (BA).
- *Anacamptis pyramidalis* : les Gravettes à St-Georges-de-Gréhaigne (A.Mx), Ile Besnard à St-Coulomb (CP).
- *Anagallis minima* : la Touche à Plerguer (LD), près de l'étang de Careil à Iffendic (CF), étang de la Promenade à Crévin (PT).
- *Andryala integrifolia* : la Grée au Sel-de-Bretagne, Avenue Charles Tillon à Rennes, revu à la Ville Rouge à Montauban, Voie express à Pléland-le-Grand et Tréffendel (LD).
- *Aquilegia vulgaris* : la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (LD-AM), bois de la Chalopinais à Pancé, le Grand-Héral à Sixt-sur-Aff (LD), la Jaunais à Poligné (PT).
- *Arctium lappa* : la Rosière en Plerguer (LD).
- *Artemisia verlotorum* : la Cour d'Avril à la Fresnais (LD).
- *Azolla filiculoides* : tourbière de Chateauneuf (LD).
- *Bilderdykia dumetorum* : la Coquinais à Ste-Anne-sur-Vilaine (BA-HT).

- *Brachypodium pinnatum* : la Villebeau à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Bromus ramosus* : le Pré Claret à Gaël (LD).
- *Calamagrostis epigeios* : l'Etang Neuf à Québriac (LD-RR), la Vallée à Vezin-le-Coquet (BA).
- *Calamintha sylvatica subsp ascendens* : le Mont-Dol (LD, CP).
- *Cardaria draba* : La Fresnais à Roz-Landrieux, les Cancales au Vivier-sur-Mer (LD), le Verger à Cancale (CP).
- *Carex caryophyllea* : les Epinais à Mernel (PT).
- *Carex disticha* : affluent de la Seiche à Amanlis (PT).
- *Carex hostiana* : Moulin de Corbonnais à Epiniac, Ile de la Tranquillité à Gaël (LD), Pierre Barge à Campel (PT).
- *Carex nigra* : le Héran à Muel (LD).
- *Carex pallescens* : le Bas-Guily à Maxent (PT).
- *Carex pendula* : la Touche à Plerguer (LD), les Forges à Pleurtuit (CP), ruisseau de la Maisonnais à Orgères, la Caltais à Bourg-des-Comptes (PT).
- *Carex serotina* : étang de la Lande d'Ouée à Gosné (DC).
- *Carex vulpina* : bois de St-Fiacre à Gahard (DC), étang de Châtillon-en-Vendelais (YB).
- *Carpobrotus edulis* : rochers de la plage du Val à St-Malo/Rothéneuf (AG).
- *Centaurea aspera* : dunes des Longchamps à St-Lunaire (PLM).
- *Centaurea calcitrapa* : port de St-Malo (HT).
- *Centaureum pulchellum* : la Gautraie à St-Jacques-de-la Lande (BA-AG).
- *Chenopodium vulvaria* : la Gautraie à St-Jacques-de-la-Lande (BA-AG).
- *Cicendia filiformis* : les Landes Blanches à Baulon (LD), les Fontenelles à Pléchatel (AM), étang du Pas du Houx à Paimpont (CF).
- *Cladium mariscus* : revu à la tourbière de Châteauneuf (LD).
- *Conyza bonariensis* : port de St-Malo (HT).
- *Corydalis lutea* : le Val St-Revert à Roz-sur-Couesnon (PT).
- *Crassula tillaea* : forêt de Paimpont à Gaël, le Mont-Dol (LD), Pointe de la Brebis à La Richardais (HT), le Plessis à Orgères (PT).
- *Cynodon dactylon* : gare de Messac (LD).
- *Daphne laureola* : bois du Petit Géraux et la Grée à Le Sel-de-Bretagne, Bois de la Chalopiniais à Pancé (LD), la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (LD-AM), Mainténiac à Pléchatel, bois de la Mélière à Pancé, la Chatière à Le Sel-de-Bretagne, la Rivaudière à Chevaigné (PT).
- *Dittrichia graveolens* : mines de Pont-Péan (BA).
- *Draba muralis* : Gare de Dol-de-Bretagne (LD), Corbinière à Messac (BA-HT).
- *Egeria densa* : bord de l'Aff à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Elodea nuttallii* : l'Etang Neuf à Québriac, les Prés de Fouy à Ste-Marie (LD).
- *Eragrostis minor* : gare de Plerguer (LD).
- *Erodium maritimum* : Fort National à St-Malo (PT), revu à l'île Cézembre à St-Malo (PLM).
- *Euphorbia serrulata* : la Coquinois à Ste-Anne-sur-Vilaine (BA-HT).
- *Festuca gigantea* : les Landes Blanches à Baulon, la Vallée du Canut à Lassy, la Plesse à Ercé-en-Lamée, Trégaret à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Galinsoga parviflora* : la Gaudichais à Cancale (AG).
- *Galium verum* : le Mont-Dol (LD).
- *Gastroidium ventricosum* : les Bignons à Le Sel-de-Bretagne, le Grand Héréal à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Genista tinctoria* : la Hubertière à Goven (BA).

- *Geranium pusillum* : Bonaban à la Gouesnière, la Gare de Plerguer, le Mont-Dol, près du Bourg de Châteauneuf, l'Île Cézembre à St-Malo (LD).
- *Groenlandia densa* : revu à la Gautraie en St-Jacques-de-la-Lande (BA-AG).
- *Gnaphalium luteo-album* : étang du Pas du Houx (CF), la Belle Etoile à Orgères (PT).
- *Hieracium lactucella* : Ile de la Tranquillité à Muel, les Bignons à Le Sel-de-Bretagne (LD).
- *Juncus capitatus* : les Landes Blanches à Baulon, le Ritoir à Lassy (LD).
- *Lagarosiphon major* : la Boulais à Ste-Marie (LD-PT).
- *Lemna minuta* : le Grand Bois à Québriac, étang d'Apigné à Rennes (LD), Landemaraais à Parigné (CF).
- *Lemna trisulca* : tourbière de Châteauneuf (LD-CP).
- *Lepidium rudemale* : port de St-Malo (HT), le Mont-Dol (LD).
- *Lophochloa cristata* : zone artisanale de la Rte de Lorient à Rennes (BA).
- *Luzula sylvatica* : bordure de la carrière de Trékoët à Muel (LD-PT).
- *Melittis melissophyllum* : bois de la Robichère à Parcé (PT), bois de la Mélière à Pancé (LD).
- *Mibora minima* : revu aux Landes Blanches à Baulon (LD), anse du Lupin à St-Coulomb (CP), la Coquinois à Ste-Anne-sur-Vilaine (BA-HT).
- *Montia perfoliata* : le Château-Richeux à St-Méloir-des-Ondes (LD), la Pointe du Meinga à St-Coulomb (PT).
- *Narcissus x medioluteus* : le Petit Gué (GG), Carfantin à Dol-de-Bretagne, la Hallandais à Bagger-Morvan (CP).
- *Orchis x alata* : le Ronceray à Lassy (PT).
- *Panicum miliaceum* : le Héran à Muel (LD), le Goulet à St-Thurial (BA-HT).
- *Papaver strigosum* : Gare de Messac, la Prévalaye à Chartres-de-Bretagne (LD).
- *Petrorhagia prolifera* : mine de Pont-Péan (BA), Port-Hue à St-Briac (CP).
- *Petrorhagia saxifraga* : au pied d'un mur, rue Martenot à Rennes (BA).
- *Poa bulbosa* : le Mont-Dol (LD).
- *Polycarpon tetraphyllum* : Villejean à Rennes (HT), le Temple du Cerisier à St-Jacques-de-la-Lande (BA-HT).
- *Potamogeton cf berchtoldii* : la Basse-Groussiniais à Ste-Marie, Landemaraais à Parigné (CF).
- *Potamogeton perfoliatus* : Corbinière à Messac (BA-HT).
- *Potamogeton trichoides* : étang du bourg à St-Gilles (JH).
- *Potentilla neglecta* : la Ville Betton à Roz-sur-Couesnon (PT).
- *Potentilla recta* : Mingé au Sel-de-Bretagne (LD), la Grée au Sel-de-Bretagne (LD-AM).
- *Prunus x fruticans* : l'Aupinière à la Fresnais, la Bassière à Cherrueix, le Mont-Dol (LD).
- *Ranunculus arvensis* : gare de Messac (LD).
- *Ranunculus auricomus* : bois de la Feutelais à Tresboeuf (LD), Trégaret à Sixt-sur-Aff (LD-PT), la Mouillemuse à Noyal-Châtillon (PT).
- *Ranunculus drouetii* : l'Aupinière à la Fresnais, Polder du Mont-Dol (LD).
- *Ranunculus omiophyllum* : Tourbière de Châteauneuf, Les Landes de la Haie à Gaël, le Héran à Muel, la Chataigneraie à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Ranunculus parviflorus* : le Mont-Dol (LD), la Couardière à St-Jacques-de-la-Lande (BA).
- *Reynoutria sachalinense* : Zone industrielle de la Rte de Lorient à Rennes (BA).
- *Reynoutria x bohémica* : Bonaban à la Gouesnière (LD).
- *Rhamnus cathartica* : la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (AM-LD), les Landes Blanches à Baulon, le bois du Petit Géraux à Le Sel-de-Bretagne (LD).

- *Ribes uva-crispa* : le Mont-Dol, le Chêne Vert à Dol-de-Bretagne (LD), le Moulin du Tertre à Maure-de-Bretagne, la Frenais à Pléchatel (PT).
- *Romulea columnnea* : Pointe du Meinga à St-Coulomb, Pointe du Nid à Cancale (PT)
- *Rorippa pyrenaica* : la Plassette à Orgères (PT).
- *Rubia peregrina* : la Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (AM-LD), la Grée à Le Sel-de-Bretagne, Bel Air à Tresboeuf (LD), la Jaunais à Poligné (PT).
- *Ruppia maritima* : les Guettes à St-Suliac (PT).
- *Salpichroa origanifolia* : sur un talus en bordure de route près de la Garde à St-Père (LD).
- *Samolus valerandi* : revu à la Gautraie en St-Jacques-de-la-Lande (BA-AG), l'Aupinière à la Fresnais (LD), Pointe du Décollé à St-Lunaire (PLM), Pointe du Nid à Cancale (PT), la Briantais à St-Malo (HT).
- *Sedum cepaea* : la Pommeraie au Sel-de-Bretagne (LD).
- *Senecio inaequidens* : bord de la Rocade sud et ouest de Rennes (BA), route de Nantes à Chartres-de-Bretagne (PT).
- *Setaria pumila* : la Ville Neuve à Sixt-sur-Aff (LD), bois de Cicé à Bruz, le Moulin de la Tournerais à Goven (PT).
- *Setaria verticillata var. ambigua* : la Bassière à Cherrueix (LD).
- *Silene gallica* : landes de Trékoët à Muel (LD).
- *Spiranthes spiralis* : carrière des Rochelles à Monterfil (MR), St-Saturnin à Pléchatel (AM), la Sablonnière en St-Coulomb (PLM).
- *Symphytum x uplandicum* : Monlieu à Roz-sur-Couesnon (PT).
- *Trifolium glomeratum* : Les Landes Blanches à Baulon (LD), les Bougrières à Rennes (BA), la Coquinais à Ste-Anne-sur-Vilaine (BA-HT).
- *Trifolium micranthum* : Landes Blanches à Baulon (LD).
- *Trifolium ornithopodioides* : Fort National de St-Malo (PT).
- *Trifolium suffocatum* : Fort National de St-Malo (PT), Ile Cézembre à St-Malo (LD).
- *Utricularia australis* : Rénihal à Gaël (LD-PT).
- *Valerianella rimosa* : près du bois de la Robichère à Pancé (LD), Bouyère à St-Erblon (PT).
- *Veronica filiformis* : le Mottay à Pleurtuit (PT).
- *Viola hirta* : Landes Blanches à Baulon, bois de la Chalopinais à Pancé, le Grand Héréal à Sixt-sur-Aff (LD), La Touche Epineu à Bourg-des-Comptes (LD-AM), la Jaunais à Poligné (PT).
- *Viola reichenbachiana* : la Villebeau et le Grand Héréal à Sixt-sur-Aff (LD).
- *Vulpia ciliata* : gare de l'Hermitage, la Courrouze en St-Jacques-de-la-Lande (BA).

**Observations de :** AG : Alain Galibourg - AM : Alain Morice - AMx : André Mauxion - BA : Bernard Aubin - YB : Yvon Bernez - CHF : Claudine et Hervé Fortune - CP : Christian Pian - DC : Daniel Chicouène - MC : Michel Colombet - JFC : Jean-François Combot - DM : Daniel Mariet - FP : Fanch Pustoch - GG : Gildas Gatéblé - GR : Gabriel Rivière - GT : Gérard Tiberghien - HT : Hervé Tiger - JH : Jacques Haury - LD : Louis Diard - PLM : Patrick Le Mao - MM : Mickaël Monvoisin - MR : Michel Riou - PT : Philippe Thévenin - RR : Robin Rolland - SHL : Serge Le Houitouze - SM : Serge Moulis.

---

**LOIRE-ATLANTIQUE**


---

Liste rédigée par Pierre DUPONT

***Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans le département :***

- *Asterolinon linum-stellatum* : dune de l'anse du Sud, près de la pointe Saint-Gildas à Préfailles (J.L.B.). Nouveau pour la Loire-Atlantique, mais à guère plus de dix kilomètres de sa station du nord de l'île de Noirmoutier. Site très menacé, pour sa plus grande part loti ou aménagé.
- *Cerastium arvense* : une petite station dans la partie élevée voisine de la Loire de la prairie de Mauves à Nantes (D.C., lors d'une herborisation de la S.S.N.O.F.).
- *Ceratophyllum submersum* : dans la Boire Torse, au niveau de Port Arthur à Anetz (J.L.B.).
- *Crambe maritima* : trois individus repérés à la baie du Scal, entre Batz-sur-Mer et Le Pouliguen (A.L.), juste à temps pour éviter que les engins participant au nettoyage de la marée noire de l'ERIKA ne les détruisent ; station déjà connue, entre autres par M.G.
- *Deschampsia setacea* : prairie marécageuse en friche à Port-Bonneau à Saint-Père-en-Retz et lande humide près de la D. 605 à Saint-Hilaire-de-Chaléons (D.C., 1999).
- *Equisetum telmateia* : Saffré, fossé proche de la D. 39, environ à deux kilomètres du bourg (D.C.).
- *Erica vagans* : dans une belle lande, malheureusement détruite en partie par labour, aux Caves près de Beaumard à Pontchâteau (D.C.), avec *Exaculum pusillum*, *Anagallis tenella* et diverses autres espèces intéressantes.
- *Galium parisiense* : pelouses à Pied Bercy à La Roche-Blanche, au nord d'Ancenis (D.C.), seule localité récente dans le département, mais probablement ailleurs.
- *Lathyrus tuberosus* : noté, il y a environ cinq ans, à La Montagne, au voisinage de la déchetterie (M.F.).
- *Melica ciliata* : deux nouvelles stations dans des zones rocheuses de la vallée de la Loire : sous les Folies Siffait au Cellier et sous le coteau de Juigné à Saint-Herblon (P.D.).
- *Orchis coriophora* : au voisinage de La Prée à La Plaine-sur-Mer, un pied d'abord observé par S.L., puis une vingtaine en compagnie de D.P., à peu près à l'endroit où avait été signalé par M. GODEAU dans les années 60. Deux individus dans une dépression de la dune de la Falaise à Batz-sur-Mer, notés indépendamment par M.B. et Th.G.
- *Oreopteris limbosperma* : fossé en bordure de la D. 15 dans la forêt domaniale du Gâvre, une belle touffe et deux petites (Th.C.). N'avait pas été revu en Loire-Atlantique, depuis sa trouvaille au XIXème siècle à Saint-Gildas-des-Bois.
- *Potamogeton x zizii* (*P. gramineus x lucens*) : bras de la Loire, au niveau de l'île du Bernardeau à Ancenis et de l'île Boire Rousse à Anetz (J.L.B.). N'avait pas été revu récemment dans l'ensemble du Massif armoricain.
- *Sedum andegavense* : quelques individus sur terrain rocheux, dans une parcelle surpâturée à La Roche Blanche (J.B.N.). N'avait pas été revu récemment en Loire-Atlantique.

### *Autres plantes intéressantes pour le département :*

- *Carduus crispus* : friche sablonneuse proche de la Loire à Port-Lavigne à Bouguenais (M.F.). N'était pas connu avec certitude en Loire-Atlantique.
- *Knautia arvensis* : zone calcaire du Haut-Bergon à Missillac (D.C.).
- *Lagarosiphon major* : mare dans une ancienne carrière près du Pas de la Haie à Arthon-en-Retz (D.C., 1999). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Monotropa hypopytis* : plus répandu qu'on ne le pensait dans le département. Bois de Juzet à Guéméné-Penfao (M.F.). Plusieurs stations en Presqu'île guérandaise : bois de la Cour aux Loups et de Coët-Caret à Herbignac, la Ville au Vent à Saint-Molf (A.L.), près de Bouzaire à Guérande (Y.M.).
- *Mycelis muralis* : au voisinage d'un ruisseau près du manoir de la Briandais à Missillac (D.C.). N'avait pas été noté récemment en Loire-Atlantique.
- *Nardus stricta* : une touffe près de l'étang du Vioreau (J.B.N.), très raréfié en Loire-Atlantique.
- *Plantago holosteum (P. recurvata)* : retrouvé pelouse littorale rase au Pouliguen, pas loin de l'îlot où H. des ABBAYES l'avait noté (M.G.) ; paraît se rattacher au type.
- *Scabiosa maritima* : naturalisé aux anciens chantiers navals de l'île Sainte-Anne à Nantes (J.B.N.). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Vallisneria spiralis* : dans le Tenu, près d'Ardennes à Sainte-Pazanne - Saint-Mars-de-Coutais (D.C.). N'était pas encore connu dans le département au sud de la Loire (D.C.).

**Observations de :** M.B. : Mikaël Buord, D.C. : Dominique Chagneau, Th. C. : Thierry Coïc, P.D. : Pierre Dupont, M.F. : Maryvonne Fauberteau, M.G. : Michel Garnier, Th. G. : Thomas Geslin, J.B.N. : Jardin Botanique de Nantes (Philippe Férard), A.L. : Aurélia Lachaud, S.L. : Sébastien Larvor, J.L.B. : Jean Le Bail, Y.M. : Yannick Mossu, D.P. : Daniel Pilvin.

---

## MAINE-ET-LOIRE ARMORICAIN

---

Liste rédigée par Emmanuel DOUILLARD et Olivier GABORY

### *Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 stations dans le département :*

- *Adenocarpus complicatus* : Le Longeron (station revue, CV-OG).
- *Ajuga chamaepitys* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Arnoseris minima* : Le Longeron (ED).
- *Bromus commutatus* : Le Puiset-Doré (ED).
- *Carex strigosa* : La Poitevinière (>100 m<sup>2</sup>, ED).
- *Crataegus laevigata* : Chemillé (OG), La Jumellière (AB-ED), Melay (AB-ED), Cholet (OG-ED).
- *Cyperus flavescens* : Drain (OG-ED), St André-de-la-Marche (OG), St Pierre-Montlimart (OG).
- *Dipsacus pilosus* : Botz-en-Mauges (SF).
- *Epilobium palustre* : La Poitevinière (OG-ED).
- *Equisetum telmateia* : Chemillé (YG-OG).

- *Galium debile* : Le Fuilet (BC-MA-ED).
- *Hottonia palustris* : La Varenne (EL-BM-ED).
- *Potentilla tabernaemontani* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Sesamoides purpurascens* : St-Laurent-des-Autels (redécouverte de la station mentionnée par BOREAU, ED).
- *Seseli montanum* : Bouzillé (OG-ED).
- *Teucrium botrys* : Montjean-sur-Loire (JB-OG-ED).
- *Trifolium michelianum* : Liré (CP), St-Laurent-du-Mottay (CP).

### *Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans plus de dix stations :*

- *Cardamine parviflora* : St-Florent-le-Vieil (CP), St-Laurent-du-Mottay (CP, >200 pieds).
- *Corydalis solida* : Beaupréau (MC-EL), La Varenne (EL-ED).
- *Cyperus fuscus* : Beaupréau (ED), St-Laurent-du-Mottay (OG-ED).
- *Cyperus michelianus* : St-Laurent-du-Mottay (OG-ED).
- *Doronicum plantagineum subsp. plantagineum* : Beaupréau (MC-EL), Botz-en-Mauges (OG-ED), La Boissière-sur-Evre (EL-ED), La Varenne (EL-BM-ED), St-Pierre-Montlimart (OG).
- *Euphorbia dulcis* : Bouzillé (OG-ED), Jallais (CP-ED), St Lézin (AB-ED).
- *Isopyrum thalictroides* : Beaupréau (EL-MC), St-Laurent-des-Autels (ED).
- *Orchis ustulata* : La Boissière-sur-Evre (EL-ED), St-Pierre-Montlimart (OG-ED), St-Léger-des-Bois (PG).
- *Peucedanum gallicum* : Chanteloup-les-Bois (MC-OG), Cholet (OG), Nuaillé (MC-OG).
- *Pulicaria vulgaris* : St-Laurent-du-Mottay (OG-ED), Angers (N.G.).
- *Sedum rubens* : Botz-en-Mauges (SF), St Gemmes-sur-Loire (GBA), Bouchemaine (GBA), Murs-Erigné (GBA).

### *Autres taxons intéressants pour le département :*

- *Acinos arvensis* : Montjean-sur-Loire (ED).
- *Anthoxanthum aristatum* : Le Longeron (CV-OG), La Chapelle-st-Florent (OG).
- *Apium graveolens* : Chemillé (OG), St-Sauveur-de-Landemont (OG).
- *Barbarea intermedia* : Le Puiset-Doré (EL-ED).
- *Barbarea verna* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Borago officinalis* : Montrevault (OG), St-Rémy-en-Mauges (ED).
- *Carex paniculata* : Jallais (CP-ED), La Chapelle-Rousselin (CP-ED).
- *Centaurea jacea* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Centaureum pulchellum* : La Poitevinière (OG), St-Léger-des-Bois (PG).
- *Cerastium brachypetalum* : La Renaudière (OG-ED), La Tourlandry (ED), St-Pierre-Montlimart (OG).
- *Crepis foetida* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Dryopteris affinis subsp. affinis* : Neuvy-en-Mauges (OG), St-Germain-sur-Moine (OG).
- *Dryopteris affinis subsp. borneri* : Chemillé (OG).
- *Eleocharis multicaulis* : Le Fuilet (BC-ED).
- *Erica ciliaris* : St-Rémy-en-Mauges (OG).
- *Erysimum cheiranthoides* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Euphorbia hyberna* : St-Germain-sur-Moine (ED).



- *Filago pyramidata* : Montjean-sur-Loire (OG-ED), La Chapelle-St-Florent (BDF-OG-ED).
- *Galanthus nivalis* : Liré (OG).
- *Genista anglica* : Le Fuilet (OG), Longeron (CV), Vezins (ED).
- *Geranium purpureum* : Chemillé (OG), La Chapelle-st-Florent (OG), Le Mesnil-en-Vallée (OG), St-Pierre-Montlimart (OG), St-Sauveur-de-Landemont (MC-OG), St-Léger-des-Bois (PG), Botz-en-Mauges (SF).
- *Gypsophila muralis* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Hypericum elodes* : La Poitevinière (redécouverte de la station mentionnée par PREAUBERT, ED).
- *Hypericum linariifolium* : La Chapelle-st-Florent (OG), Montjean-sur-Loire (OG-ED), Le Longeron (CV-OG), Botz-en-Mauges (SF).
- *Hypericum montanum* : Le Longeron (CV-OG).
- *Hypochoeris maculata* : Le Puiset-Doré (ED).
- *Juncus compressus* : Liré (ED), Bouzillé (ED).
- *Juncus tenageia* : St-Rémy-en-Mauges (ED).
- *Lathyrus nissolia* : Le Puiset-Doré (EL-ED).
- *Leersia oryzoides* : Drain (OG-ED).
- *Lepidium campestre* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Lepidium heterophyllum* : Chemillé (OG), Cholet (OG-ED), La Chapelle-St-Florent (OG), La Poitevinière (OG), La Renaudière (OG-ED), St-Pierre-Montlimart (OG-ED).
- *Lindernia dubia* : St-Laurent-du-Mottay (OG-ED).
- *Lithospermum arvense* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Lonicera xylosteum* : La Jubaudière (YG).
- *Lotus angustissimus* : Chemillé (OG), La Chapelle-st-Florent (OG), Le Longeron (OG), St-Pierre-Montlimart (OG), Botz-en-Mauges (SF).
- *Luzula pilosa* : La Poitevinière (ED), St-Léger-des-Bois (PG).
- *Lythrum portula* : La Poitevinière (OG-ED), Le Fief-Sauvin (OG), Le Puiset-Doré (OG-ED), St-André-de-la-Marche (OG).
- *Medicago polymorpha* : Botz-en-Mauges (SF).
- *Micropyrum tenellum* : La Renaudière (OG-ED), Montjean-sur-Loire (OG-ED), La Chapelle-st-Florent (BDF).
- *Minuartia hybrida* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Oenanthe peucedanifolia* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Orobanche hederacae* : St-Florent-le-Vieil (OG-ED), Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Oxalis acetosella* : Le Longeron (ED).
- *Parentucellia viscosa* : La Poitevinière (OG), Le Puiset-Doré (ED), St-Rémy-en-Mauges (ED), Yzernay (OG-ED).
- *Petroselinum segetum* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Phyteuma spicatum* : Montrevault (OG).
- *Potamogeton obtusifolius* : St-Germain-sur-Moine (sortie Mauges Nature).
- *Potamogeton polygonifolius* : Le Fief-Sauvin (BM-EL-ED), Le Puiset-Doré (OG-ED), St-Laurent-des-Autels (BM-EL-ED).
- *Quercus ilex* : La Chapelle-St-Florent (OG), St-Florent-le-Vieil (ED).
- *Radiola linoides* : St-Rémy-en-Mauges (ED).
- *Rorippa sylvestris* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Salix triandra* : Liré (CP).
- *Scabiosa columbaria* : Torfou (CB-ED).
- *Scirpus sylvaticus* : Botz-en-Mauges (ED).

- *Sedum forsterianum* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Spergula morisonii* : La Renaudière (OG-ED).
- *Spiranthes spiralis* : St-Léger-des-Bois (PG).
- *Trifolium glomeratum* : Botz-en-Mauges (SF).
- *Trifolium squamosum* : La Chapelle-st-Florent (OG).
- *Urtica urens* : Yzernay (OG-ED).
- *Verbascum nigrum* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Veronica acinifolia* : Montjean-sur-Loire (OG-ED), St-Pierre-Montlimart (OG), Yzernay (OG-ED).
- *Veronica agrestis* : Montjean-sur-Loire (OG-ED), St-Pierre-Montlimart (OG-ED), Yzernay (OG-ED).
- *Veronica anagalloides* : Beaupréau (ED).
- *Vicia lathyroides* : Yzernay (OG-ED).
- *Vicia lutea* : Montjean-sur-Loire (OG-ED).
- *Viola lactea* : Le Fuilet (BC-ED).

**Observations de :** Ambroise BECOT (AB), Claude BOURGET (CB), Jacques BOYER (JB), Bernard CLEMENT (BC), Michel CHAPLAIS (MC), Emmanuel DOUILLARD (ED), Bruno de FOUCAULT (BDF), Sylvie FOUCAULT (SF), Olivier GABORY (OG), Yves GABORY (YG), Pascal GILLES (PG), Nicolas GEORGES (NG), Groupe Botanique Angevin (GBA), Emmanuel LEHEURTEUX (EL), Mickaël AUDOUIN (MA), Blaise MICARD (BM), Christophe PINEAU (CP), Claude VIGNERON (CV).

---

## MANCHE

Liste rédigée par Catherine ZAMBETTAKIS

Ce bilan intègre non seulement de nouvelles stations, mais également des confirmations de la présence d'espèces.

### Espèces prioritaires de la Liste Rouge armoricaine :

- *Carex liparocarpos* : Bréhal, en bordure du Golf (C.Z.).
- *Lathyrus maritimus* : Auderville, Port de Goury (O.B.).

### Espèces de la Liste Rouge armoricaine :

- *Aceras anthropophorum* : Barneville, Flèche sableuse (J.G.).
- *Carex lasiocarpa* : Le Mesnil au Val, La table aux fées (J.G.).
- *Catabrosa aquatica* : Doville, Marais de la Sangsurière (JP.M).
- *Centaurium scilloides* : Jobourg, Anse du Culeron (J.G.).
- *Drosera intermedia* : Ste Croix Hague, Clairefontaine (J.G.) ; Ste Croix-Hague, Gros Mont (J.G.).
- *Drosera rotundifolia* : Ste Croix-Hague, Le Fieffe (J.G.) ; Vauville, La table aux fées (J.G.).
- *Dryopteris aemula* : Martinvast, La Fournellerie (J.G.).
- *Epipactis helleborine* : Héauville, Les Mielles (J.G.).
- *Equisetum sylvaticum* : Le Mesnil au Val (J.G.).
- *Lycopodiella inundata* : Le Mesnil au Val, La table aux fées (J.G.).
- *Menyanthes trifoliata* : Gréville Hague (J.G.).
- *Ophrys sphegodes sphegodes* : Barneville, Flèche sableuse (J.G.).

- *Rhynchospora alba* : Ste Croix-Hague, Gros Mont (J.G.).
- *Rumex rupestris* : Jobourg, Anse du Culeron (J.G.).
- *Saxifraga granulata* : Barneville, Flèche sableuse (J.G.).
- *Scirpus pungens* : Héauville, Les Mielles (J.G.).

**Espèce protégée en Basse-Normandie non inscrite dans la Liste Rouge :**

- *Clematis flammula* : Barneville, Flèche sud du Havre. (J.G.).

**Espèces adventices :**

- *Digitaria ischaemum* : Tonneville, L'étang Percy (J.G.).
- *Hemerocallis fulva* : Vauville, Table des fées (J.G.).
- *Vicia villosa subsp. villosa* : Héauville (J.G.). C'est une espèce non revue depuis fort longtemps dans la région (d'après l'Atlas de M.P.).
- *Allium triquetrum* : Cherbourg, La Fauconnière (J.G.).

**Observations de :** O.B. : Olivier Bardet, J.G. : Johan Gourvil, J.P.M : Jean-Pierre Merse, C.Z. : Catherine Zambettakis.

## CALVADOS ARMORICAIN

Liste rédigée par Catherine ZAMBETTAKIS

Ce bilan intègre non seulement de nouvelles stations, mais également des confirmations de la présence d'espèces.

**Espèces de la Liste Rouge armoricaine :**

- *Drosera rotundifolia* : Jurques, Landes (M.P.).
- *Juncus squarrosus* : Jurques, Landes (M.P.).
- *Scirpus cespitosus subsp. germanicus* : Jurques, Landes (M.P.).

**Espèce protégée en Basse-Normandie, non inscrite dans la Liste Rouge :**

- *Asplenium marinum* : St Pierre du Mont, Pointe du Hoc (V.D.).

**Observations de :** V.D. : Vianney Dalibard, M.P. : Michel Provost.

## MAYENNE

Liste rédigée par Bertrand JARRI

**Espèces de la Liste Rouge armoricaine, annexe I :**

- *Lathraea squamaria* L. : Vallon du Venez, Chéméré le Roi (B.J; D.L). Belle station d'une trentaine d'individus, dans un sous-bois frais. Espèce protégée au niveau régional.
- *Pilularia globulifera* L. : Plan d'eau dans une clairière de la forêt de la Grande charnie, Sainte Suzanne (B.J ; M.G ; M.R ; A.B). Station d'une bonne dizaine de mètres carrés, en tapis dense. Espèce protégée au niveau national.
- *Ranunculus lingua* L. : Etang de Cornesse, Saint Pierre la Cour, la Brûlatte (B.J). Station conséquente dans la queue de l'étang en voie d'atterrissement. Espèce protégée au niveau national.

- *Eleocharis ovata* (Roth) Roem et Schult. : Etang de Neuville (F.L).
- *Isopyrum thalictroides* L. : Bois de la Grommière, Saint Cénére (F.L).

### *Espèces de la Liste Rouge armoricaine, annexe II :*

- *Agrimonia procera* Wallr. : La Bréhennière, Saint Christophe du Luat (F.L).
- *Elatine hexandra* (Lapierre) DC. : Etang de Neuville, Jublains (FL).
- *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. : Saint Denis d'Anjou (B.J).
- *Hottonia palustris* L. : Bois des Effretais, Saint Pierre la Cour (B.J).
- *Ophrys apifera* Huds. : Carrière de Feux-Vilaine, Saint Pierre la Cour (B.J).
- *Lathyrus sylvestris* L. : Saint Laurent des Mortiers (Y.L, M.O).
- *Najas marina* L. : Etang de Neuville, Jublains ; étang du Gué de selle, Mézangers (F.L).
- *Selinum carvifolia* (L.) L. : Chemin de la Javellière, Montsûrs (F.L).
- *Helleborus foetidus* L. : Four à chaux, Louverné (M.R).

### *Autres espèces intéressantes pour le département :*

- *Acorus calamus* L. : mare du lieu-dit la Rotherie, Loiron (B.J). C'est la première mention mayennaise de cette adventice naturelle du sud asiatique. Je n'ai pas vérifié si l'espèce avait fructifié. Le propriétaire m'a alerté sur la présence de cette plante nouvelle dans sa mare, après avoir transplanté une motte de terre provenant d'une autre mare !
- *Anchusa arvensis* (L.) Bieb. : Chemazé (M.O).
- *Andryala integrifolia* L. : Gorron (A.B). Pour le moment, c'est la station la plus «nordique» dans le département.
- *Anthemis arvensis* L. : Loigné sur Mayenne (M.O, J.G).
- *Azolla filiculoides* Lam. : Daon (B.J ; confirmation R. Prelli). Fougère originaire d'Amérique tropicale et tempérée, adventice naturelle. Introduite en 1926 dans l'étang du Frêne, commune de Sacé. Elle n'y a jamais été retrouvée (Des Abbayes, 1971). La localité de Daon semble donc être la première localité spontanée du département.
- *Chenopodium glaucum* L. : Saint Laurent des Mortiers (M.O).
- *Daphne mezereum* L. : Bois des Effretais, Saint Pierre la Cour (B.J). Première mention mayennaise pour cette thyméléacée plutôt montagnarde. Trois individus ont été notés.
- *Euphorbia maculata* L. : Laval (M.R), Loiron (M.O).
- *Eragrostis minor* Host. : Laval (M.R). Cette graminée n'est pas mentionnée en Mayenne dans la flore de Des Abbayes. Il s'agit d'une espèce nouvelle pour le département. C'est une adventice naturelle, originaire du Sud de l'Europe, du Sud de l'Asie et du Nord de l'Afrique.
- *Hydrochaeris morsus-ranae* L. : Etang de Beaucoudray, Aron (B.J).
- *Littorella uniflora* (L) Aschers. : Etang de Neuville, Jublains (F.L). Protégée nationalement.
- *Luronium natans* (L) Rafin. : Etang de Beaucoudray, Aron (F.L). Protégée nationalement.
- *Mentha x carinthiaca* Host : Le Gros Chêne, Sainte Suzanne (B.J ; M.G ; M.R ; A.B). Hybride entre *Mentha arvensis* L. et *Mentha suaveolens* Ehrh., signalé pour la première fois dans le département. Elle croissait dans des secteurs piétinés par des chevaux. Les individus étaient robustes et abondamment fleuris.

- *Oenothera erythrosepala* Borbas. : Saint Berthevin (M.O, J.G). Sans doute une échappée de jardins.
- *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel : Clairière en forêt de la Grande Charnie, Sainte Suzanne (B.J ; M.G ; M.R ; A.B).
- *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. : Laval (M O).
- *Sagittaria sagittifolia* L. : Etang de Neuville, Jublains (B.J, F.L).
- *Samolus valerandi* L. : Saulges (B.J).
- *Zannichellia palustris* L. : Plan d'eau de Saint Denis d'Anjou (M.R).
- *Soleirolia soleiroleii* (Req.) Dandy : Bourg de saint Denis d'Anjou (M.R).

**Observations de :** B.JARRI (B.J) ; A. BEDOUET (A.B.) ; M. RAVET (M.R) ; D. LAURENDEAU (D.L) ; M.GERARD (M.G) ; H.HUBERT (H.H) ; Y. LANGLOIS (Y.L) ; M.ORGEVAL (M.O) ; F LE BLOCH (F.L) ; J. GUYON (J.G).

---

## MORBIHAN

Liste rédigée par Gabriel RIVIÈRE

### Espèces de la Liste Rouge armoricaine présentes dans moins de 10 localités :

- *Adiantum capillus-veneris* L. – Ile aux Chevaux au sud de Houat (Y.G. 07/2000).
- *Anogramma leptophylla* (L.) Link – Vallée du Sedon en Guégon (2 stations) (G.R. 04/03/2000) ; la Croix aux Chênes en Pluherlin (G.R. 12/03/2000). Nouveau pour le Morbihan.
- *Butomus umbellatus* L. – Revu à Donnant à Belle-Ile (C.B. 06/00).
- *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch – Environs de Kerascouet en Erdeven (C.F. 06/00). Revu à Houat et Hoedic (C.F., R.R., G.R. 06/00).
- *Ceratophyllum submersum* L. – Marais de Suscinio en Sarzeau (G.R. 10/00).
- *Cuscuta planiflora* Ten. *subsp. godronii* (Desmoulins) Kerguélen – Kérel en Bangor et Port-Blanc en Locmaria (Belle-Ile) (C.B. 08/00).
- *Cyperus flavescens* L. – Revu à l'Etang Neuf en St-Martin-sur-Oust (G.R. 09/00, C.F. 10/00).
- *Damasonium alisma* Miller – Les Govelins en St-Gildas-de-Rhuys (A.M.B.H.H.C. 06/00) ; Lasné en St-Armel (M.C.M.).
- *Equisetum telmateia* Ehrh. – Kerdalvé en Plouay (M.D. 03/00, revu G.R. et G.S. 05/00).
- *Filipendula vulgaris* Moench – Port Cotton en Bangor (C.B. 08/00).
- *Gladiolus illyricus* Koch – Aérodrome de Loyat (G.R. 06/00).
- *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. – RR carrière de Locuon en Ploërdut (Y.L.C. 04/00, J.M., G.R.).
- *Isoetes histrix* Bory – Houat (7 stations vers l'extrémité nord-ouest de l'île) (G.R. et Ph.T. 05/00). 1<sup>ère</sup> observation à Houat depuis VANDEN BERGHEN (1962).
- *Juncus squarrosus* L. – Lande de l'aérodrome de Guiscriff (G.R. 07/00).
- *Ophioglossum lusitanicum* L. – Houat (5 stations vers l'extrémité nord-ouest de l'île) (G.R. et Ph.T. 05/00). 1<sup>ère</sup> observation à Houat depuis LLOYD (vers 1850) ?
- *Orchis ustulata* L. *subsp. ustulata* – Revu à Vannes près de Conleau (A.L.R. 04/00).
- *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link – Revu 1 touffe à la Grée Penvins en Sarzeau (S. Bota. 09/00).

- *Pancreaticum maritimum* L. – La Grée Penvins en Sarzeau (3 indiv. S. Bota. 09/00) ; Kerminihy en Erdeven (F.Tin.).
- *Pulicaria vulgaris* Gaertner – La Halnaudais en Ploërmel (G.R. 08/00).
- *Rumex bucephalophorus* L. s.l. – Hoedic (R.R. et A.M.B.H.H.C. 06/00).
- *Sedum caespitosum* (Cav.) DC. – Se maintient à St-Gildas-de-Rhuys. En expansion : RD 780 près de Sarzeau et de Noyal, Arzal, RD 767 près de Locmaria-Grand-Champ (2 stations) (G.R. 04-05/00). Adventice naturalisé.
- *Sesamoides purpurascens* (L.) López González (*S. canescens* auct., non (L.) O.Kuntze) – Marzan près du pont de La Roche-Bernard (G.R. 03/00) (cf. ARRONDEAU 1867 : « La Roche-Bernard, à l'extrémité du pont »).

### *Autres espèces protégées ou de la Liste Rouge armoricaine :*

- *Bellardia trixago* (L.) All. – Fort Bloqué en Guidel (C.F. 2000).  
- var. *bicolor* D.C. – Hoedic (A.M.B.H.H.C. 06/00).
- *Carex rostrata* Stokes in With. – Pont-Calleck en Berné (C.F. 2000) ; Couëdic-Izel en Inzinzac-Lochrist (Ph. T. 2000). Connu maintenant dans plus de 25 localités du département.
- *Drosera intermedia* Hayne – Lande de l'aérodrome de Guiscriff (G.R. 07/00) ; forêt de Floranges (A.B.).
- *Drosera rotundifolia* L. – Etang des Landes de Couesmé en St-Nicolas-du-Tertre (G.R. 10/00).
- *Epilobium palustre* L. – Crac'h (C.F. 2000).
- *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl. – Camp de Coëtquidan en Campénéac (G.R. 09/00) ; Houat (R.R. 09/00) ; Néant-sur-Yvel (G.R. & C.F. 10/00).
- *Galium debile* Desv. (*G. constrictum* Chaub. in St-Amans) – Landes à l'ouest de Loriliaie en Caro (G.R. 07/00).
- *Humulus lupulus* L. – Semble RR dans la région maritime : Houat (R.R. 09/00).
- *Juncus pygmaeus* L.C.M. Richard ex Thuill. – Crucuno en Erdeven (C.F. 06/00) ; Lac au Duc en Taupont (G.R. 07/00).
- *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – Le Lindin en Sarzeau (G.S. 2000). Revu à Houat (A.M.B.H.H.C. 06/00).
- *Ophrys passionis* Sennen ex J.& P. Devillers-Terschuren – Pointe du Conguel en Quiberon (F.S. 04/00) ; Houat (G.R. et Ph.T. 05/00), Hoedic (G.R. et G.S. 05/00). Jusqu'à preuve du contraire, *Ophrys sphegodes* semble absent du Morbihan (F.S.).
- *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – Hoedic (G.R. et G.S. 05/00) ; Houat (A.M.B.H.H.C. 06/00).
- *Pilularia globulifera* L. – Camp de Coëtquidan en Campénéac, Courte Branche en forêt de Lanouée (G.S. 2000).
- *Polygonum maritimum* L. – Kerpenhir en Locmariaquer (C.F. 10/00) ; Bétahon en Damgan (G.S. 2000) ; pointe du Moustoir en Muzillac, Tréhervé en Ambon, pointe du Diben en Damgan, Landezac et pointe de St-Jacques en Sarzeau (A.L. 2000, très peu abondant).
- *Selinum broteri* Hoffmanns. et Link – Vallée du Tromeur en Sérent (G.R. 11/00).
- *Trichomanes speciosum* Willd. – Gamétophyte : le Quillio en Guern (J.M. 04/00) ; Ste-Barbe en Le Faouët (S.bot. 05/00).
- *Trifolium strictum* L. – Le Grand Mont en St-Gildas-de-Rhuys (C.F. et A.M.B.H.H.C. 06/00).

*Autres espèces intéressantes :*

- *Alisma lanceolatum* With – Fort-Bloqué en Guidel (C.F. 2000) ; Comper en Concoret (S.Bot. 10/00).
- *Allium triquetrum* L. – Ile-aux-Moines (subspontané) (G.R. 04/00).
- *Alopecurus aequalis* Sobol. – Douves du château de Comper en Concoret (L.D., Ph. T., C.F. & G.R. 10/00).
- *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. – Rohan (G.R. 12/00).
- *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl *subsp. elatius* – Plouhinec (C.F. et D.C. 02/00).
- *Asplenium marinum* L. – Revu à Pénestin (falaise morte ombragée du Palandrin) (G.R. 02/00).
- *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC. – Terrain militaire de Plaisance en St-Avé, sur sable probablement apporté du littoral (G.R. 05/00).
- *Azolla filiculoides* Lam. – Montertelot (G.R. 05/00) ; vallée du Blavet à Baud (C.F. 2000) ; le Skeul en Locmaria (Belle-Ile) (C.B. 06/00).
- *Calamintha ascendens* Jord. – PC à l'intérieur : Lanouée (P.M. 2000).
- *Calystegia sylvatica* (Kit.) Griseb. – Plouay, Locoal-Mendon (C.F. 10/00) ; Cahéran en Guillac (G.R. 07/00) : nouveau pour l'est du département.
- *Campanula rapunculus* L. – RR dans l'ouest : Pontivy (C.F. 2000).
- *Carduus nutans* L. – A l'intérieur : Ruffiac (C.F. 06/00).
- *Carex pendula* Huds. – Vallée du Blavet à Pontivy (adventice) (C. F. 03/00).
- *Cerastium diffusum* Pers. – A l'intérieur : RD 767 près du Pont du Loc'h en Locmaria-Grand-Champ (G.R. 05/00).
- *Cerastium semidecandrum* L. – A l'intérieur : RD 767 près de Colpo (G.R. 05/00).
- *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen – Houat (R.R. 2000).
- *Claytonia perfoliata* Donn ex Willd. (*Montia perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell) – Ile-aux-Moines (G.R. 04/00).
- *Cyperus eragrostis* Lam. (*C. vegetus* Willd.) – Etang de la Forêt en Brandivy (C.F.).
- *Daphne laureola* L. – Le Plessis en St-Dolay (G.R. 03/00).
- *Datura stramonium* L. *var. stramonium* – R à l'intérieur dans l'ouest : Coët Colay en Languidic (C.F. 10/00).
- *Dipsacus fullonum* L. – AR à l'intérieur : Lanouée (P.M. 2000).
- *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. – Houat (5 stations au nord-ouest de l'île) (G.R. et Ph.T. 05/00). Revu très abondant dans le sud de l'Ile-aux-Moines (Penhap, presqu'îles de Brannec et de Nioul), dans le centre (Kerno) et l'est (îles de Brouel) (G.R. 04/00).
- *Euphorbia portlandica* L. – Terrain militaire de Plaisance en St-Avé, sur sable sans doute apporté du littoral (G.R. 05/00).
- *Fumaria capreolata* L. – Houat (E.D. 1999 ; G.R. et Ph.T. 05/00).
- *Galeopsis segetum* Necker – Lanouée (P.M. 2000).
- *Galium murale* (L.) All. – Quiberon (Y.G. 03/00), Pen en Toul en Larmor-Baden (A.L.R. 04/2000).
- *Galium uliginosum* L. – La Pihaudaie en Peillac (G.R. 06/00). Revu à Arradon (Keravelo, A.L.R. 2000).
- *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. – A l'intérieur : Néant-sur-Yvel (G.R. 05/00).
- *Geranium robertianum* L. *subsp. purpureum* (Vill.) Nyman – A l'intérieur : Le Port-Louis en St-Allouestre (G.R. 05/00).
- *Geranium pusillum* L. – Le Stum en St-Barthélémy (C.F. 06/00).
- *Geranium pyrenaicum* Burm. fil. – Baud (C.F. 05/00).

- *Geranium rotundifolium* L. - PC à l'intérieur : Baud (C.F. 05/00).
- *Juncus acutus* L. - Ria de Sauzon (Y.B. 09/00) ; Port Skeul en Sauzon, Port Goulphar en Bangor (C.B. 2000).
- *Juncus capitatus* Weigel - A l'intérieur : le Bodan et Coët Bihan en Questembert, Gaincru en Ruffiac, landes de la Halnaudais en Ploërmel, Loyat, Pamara en Guilliers, camp de Meucon, le Manéguen en Baud (G.R. 05-08/00) ; Ste-Barbe en Le Faouët (S.bot. 05/00) ; Lesturgan en Malguénac (Y.L.C. 06/00).
- *Lathraea clandestina* L. - Moulin de la Fosse en Bréhan (P.M. 03/00) ; Linier en Plumelec (H. VICAUD 1992 ; G.R. 03/00).
- *Leersia oryzoides* (L.) Swartz - Pont-Calleck en Berné (C.F. 10/00).
- *Lemna gibba* L. - Vallée du Blavet à Baud (C.F. 2000).
- *Lemna minuta* Kunth in H.B.K. - Vallée du Blavet à Baud (C.F. et D.C. 02/00) ; Suscinio en Sarzeau (C.F., R.R. et G.R. 06/00) ; la Vallée en Peillac, vallée de l'Oust en St-Marcel (G.R. 06-09/00) et en Peillac (C.F. 10/00).
- *Limonium* cf. *× neumani* Salmon (= *L. vulgare* × *L. humile*) - Le Hézo (C.F. 2000).
- *Linum bienne* Miller - R à l'intérieur : Pontivy (C.F. 2000).
- *Lotus subbiflorus* Lag. - RR à l'intérieur : Nazareth en St-Congard (G.R. 06/00).
- *Ludwigia grandiflora* (Michaux) Greuter & Burdet in Greuter & Raus (*L. uruguayensis* (Camb.) Hara - Marais de Suscinio en Sarzeau (G.R. 10/00).
- *Ludwigia palustris* (L.) Ell. - Pont Calleck en Berné (C.F. 2000).
- *Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin - Vallée de la Claie à St-Jean-Brévelay (G.R. 01/00).
- *Mercurialis perennis* L. - St-Maurice en St-Guyomard (G.R. 11/00).
- *Mycelis muralis* (L.) Dumort. - La Cour de Bovrel en St-Guyomard (G.R. 11/00), la Riaye en Ménéac (G.R. 1000). Revu aux Tours d'Elven (G.S. 1998, G.R. 05/00).
- *Myosoton aquaticum* (L.) Moench - Malestroit (G.R. 10/00).
- *Myosotis ramosissima* Rochel in Schultes - A l'intérieur : Ste-Barbe en Le Faouët (G.R. 04/00).
- *Narcissus pseudonarcissus* L. - Cadouzan en St-Dolay (G.R. 03/00).
- *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. - Champ de maïs à Carpehaie en Malansac (G.S. 2000).
- *Oenothera striata* Link (*O. stricta* Ledeb.) - Le Goudrel en Pénestin (S.Bot. 06/00).
- *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub. - RR bois de Lochrist en Ploërdut (G.R. 07/00) ; Kerpavec en Bubry, Prad ar Gazec en Berné, Pistiagon en Meslan, Stang Ihuern en Cléguérec (Y.L.C. 08/00). Revu RD 27 en Guiscriff (60 indiv. G.R. 07/00).
- *Origanum vulgare* L. - R à l'intérieur : vallée du Sedon en Guégon (P.M., G.R. 08/00). Revu à Pontivy (château : C.F. 09/00).
- *Oxalis dillenii* Jacq. - RR à Baud (C.F. et D.C. 10/00). Nouveau pour la Bretagne péninsulaire.
- *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel - A l'intérieur : RD 5 près de Molac (G.R. 06/00), RD 27 en Guiscriff (G.R. 07/00), la Ville ès Turniaux en Ménéac (G.R. 10/00).
- *Petasites pyrenaicus* (L.) López González (*P. fragrans* (Vill.) C. Presl) - Baud (C.F. 02/00).
- *Picris echioides* L. - A l'intérieur : Camors (C.F. 2000).
- *Pinguicula lusitanica* L. - Forêt de Floranges (C.F. 2000).
- *Plantago scabra* Moench (*P. arenaria* Waldst. & Kit., *P. indica* L.) - Kermoël (île de Groix) (C.B. 08/00).
- *Poa compressa* L. - Mauron (G.R. 10/00).



- *Poa infirma* Kunth – C sur le littoral ; devenu AC à l'intérieur : La Roche-Bernard, Marzan, St-Vincent, Josselin, Pontivy, Baud, vallée du Blavet en Bieuzy, etc... (C.F., G.R. 03-05/00).
- *Polygonum mite* Schrank – Vallée du Blavet en Languidic (2 touffes) (C.F. 10/00).
- *Polypodium-cambricum* L. – St-Dolay (G.R. 03/00), l'Ile en Marzan (G.R. 04/00), Kerjouanno en Arzon, Suscinio en Sarzeau (G.R. 05/00) ; château de Comper en Concoret (G.R. & C.F. 09/00).
- *Potamogeton berchtoldii* Fieber in Berchtold & Opiz – Vallée du Blavet à Baud (C.F. 2000).
- *Potamogeton nodosus* Poiret in Lam. – Étangs de Gueltas (C.F. 09/00, *détermination confirmée par C.D. PRESTON*). Nouveau pour la Bretagne péninsulaire.
- *Potamogeton perfoliatus* L. – Étangs de Gueltas (C.F. 10/00).
- *Potamogeton pusillus* L. – Étangs de Gueltas (C.F. 10/00).
- *Primula veris* L. – Vallée de l'Aff à Guer (Ph. T. 2000).
- *Ranunculus auricomus* L. s.l. – La Ville d'Aval en la Gacilly (Ph.T. 04/00). Deuxième observation contemporaine en Morbihan.
- *Ranunculus baudotii* Godron – Locmariaquer (S. Bota. 04/00).
- *Ranunculus paludosus* Poiret – Chapelle de N.D. de Burgo en Grand-Champ (G.R. 05/00).
- *Ranunculus sardous* Crantz – A l'intérieur, rare dans l'ouest : Baud (C.F. 06/00).
- *Ranunculus trichophyllus* Chaix *subsp. trichophyllus* – Locmariaquer (S. Bota. 04/00).
- *Reseda luteola* L. – R dans le NW : Baud (C.F. 06/00).
- *Rumex pulcher* L. – A l'intérieur : Pontivy (G.R. 03/00) ; Comper en Concoret (G.R. & C.F. 09/00).
- *Ruppia maritima* L. – Le Hézo (C.F. 2000).
- *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl – Aéroport de Loyat, Questembert, Pleucadeuc (G.R. 05/00) ; Lesturgan en Malguénac (Y.L.C. 06/00) ; Ste-Barbe en Le Faouët (S.bot. 05/00) ; la Rougeraie et la Tertraie en Lanouée (P.M. 2000) ; Locguénolé en Kervignac (M.D. 2000).
- *Sanguisorba minor* Scop. *subsp. minor* (*Poterium dictyocarpum* Spach) – Terrain militaire de Plaisance en St-Avé, sur sable sans doute apporté du littoral (G.R. 05/00).
- *Santolina chamaecyparissus* L. – Abondant murailles de Guémené-sur-Scorff (G.R. 2000).
- *Saxifraga tridactylites* L. – A l'intérieur : Pontivy (C. F. 03/00) ; le Pont du Loc'h en Locmaria-Grand-Champ (G.R. 05/00).
- *Securigera varia* (L.) P. Lassen *subsp. varia* (*Coronilla varia* L.) – Bord du Blavet en amont de Hennebont (C.F. 09/00).
- *Senecio inaequidens* DC. – Sarzeau (G.R. 10/2000).
- *Silene uniflora* Roth *subsp. uniflora* (*S. vulgaris subsp. maritima* (With.) Á.& D. Löve) – Vallée de la Claie en Bignan (G.R. 05/00).
- *Silybum marianum* (L.) Gaertner – Pont-Augan en Languidic, vallée du Blavet à Hennebont (C.F. 02-03/00).
- *Sison amomum* L. – Marzan, près du pont de La Roche-Bernard (G.R. 03/00).
- *Smyrniolum olusatrum* L. – Adventice à l'intérieur : Persquen (C.F. 2000)
- *Sorghum halepense* (L.) Pers. – Bourg de Baud (C.F. 10/00).
- *Taraxacum* section *Erythrosperma* Dahlst. (*T. laevigatum* s.l.) – A l'intérieur : le Manéguen en Baud (G.R. 05/99).
- *Trifolium glomeratum* L. – A l'intérieur : Guillac, Nazareth en St-Congard, Château-Trô en Guilliers et Mohon (G.R. 06-07/00).

- *Trifolium incarnatum* L. *subsp. molinerii* (Balbis ex Hornem.) Syme – Ile-aux-Moines (G.R. 04/00).
- *Trifolium ornithopodioides* L. – A l'intérieur : Coët Bihan en Questembert, le Manéguen en Guénin (G.R. 05/00).
- *Trifolium suffocatum* L. - RR à l'intérieur de la Bretagne : le Manéguen en Guénin (G.R. 05/00).
- *Veronica agrestis* L. – Baud (C.F. 01/00).
- *Vicia lutea* L. – R à l'intérieur : la Mirangaine en Ruffiac (G.R. 06/00).
- *Viola hirta* L. – L'Ile en Marzan (G.R. 04/00), le Petit Mont en Arzon (G.R. 05/00).
- *Viola palustris* L. – La Croix Neuve en Cruguel (G.S. 2000) ; vallée de Vache-Gare en Sérent (G.R. 11/00). Localités en limite d'aire régionale.
- *Zannichellia palustris* L. – Le Léry en Erdeven (C.F. 2000).

La nomenclature est celle de l'Index synonymique informatisé de KERGUÉLEN (1997).

**Observations de :** Yannick BENEAT (Y.B.), Alain BINVEL (A.B.), Cyrille BLOND (C.B.), Daniel CHICOUENE (D.C.), Martine DAVOUST (M.D.), Eliane DEAT (E.D.), Claudine (Hervé, Adrien et Aurélien) FORTUNE (C.F.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Aurélie LACHAUD (A.L.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), A. LE ROUX (A.L.R.), Marie-Claire MARZIO (M.C.M.), Paul MAUGUIN (P.M.), Joseph MOISAN (J.M.), Rémy RAGOT (R.R.), Gabriel RIVIERE (G.R.), François SEITE (F.S.), Gérard SOURGET (G.S.), Philippe THEVENIN (Ph.T.), Frédéric TINTILLIER (F.Tin.), ainsi que celles faites en groupes lors de sorties botaniques (S.Bot.), et celles de l'A.M.B.H.H.C. (Association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts-Cantons, 01-04/06/00).

---

## VENDÉE ARMORICAINE

---

Liste rédigée par Pierre DUPONT

### *Taxons de la Liste Rouge armoricaine présentes dans moins de 10 localités :*

- *Carex punctata* : deux touffes en forêt domaniale de Mervent, près du rond-point du Petit Maillezais (D.C.).
- *Ecballium elaterium* : deux ou trois beaux pieds dans un terrain vague, à Château-d'Olonne (H.G.).
- *Marsilea quadrifolia* : a été noté en 1996 au marais de Noailles au Champ-Saint-Père, dans une mare récemment agrandie (Ph.R.) ; localité située en Vendée aquitaine, mais à environ 3 km de la limite armoricaine, deuxième observation récente dans le département.
- *Orchis simia* : très localisé au nord-ouest de Saint-Germain-de-Prinçay ; un seul individu sur une pelouse en bordure d'une vigne abandonnée (Th. Y., 1999, revu par M.G. en 2000) ; nouveau pour la Vendée armoricaine. Site de grand intérêt qu'il conviendrait de gérer, avec d'autres raretés comme *Crepis pulchra*, *Salvia pratensis*, *Scandix pecten-veneris*, *Tragopogon dubius*, figurant également sur la liste rouge armoricaine (P.D., M.G.).
- *Potamogeton coloratus* : prairie tourbeuse aux Charbonnières à Tallud-Sainte-Gemme (M.G.).
- *Ranunculus lingua* : une quinzaine de pieds à l'étang de la Rairie à Bazoges-en-Pareds (J.P.T.).

- *Scirpus pungens* : assez abondant dans une prairie marécageuse longuement inondée à l'arrière de la dune près de l'Héraud, au sud-est de Saint-Jean-de-Monts, accompagné de diverses espèces intéressantes, comme *Orchis laxiflora subsp. palustris*, *Ranunculus ophioglossifolius*, *Samolus valerandi* (E.D.). Seule localité actuellement notée en Vendée. Le site demanderait des mesures de sauvegarde.

- *Serapias cordigera* : quelques pieds observés près de La Guittière à Talmont-Saint-Hilaire en juin 2000 (A.T.), en territoire aquitain mais tout près de la limite armoricaine. C'est la seule plante présumée disparue dans la région des Pays de la Loire qui avait été retenue, en cas de redécouverte, sur la liste régionale des espèces protégées.

### *Autres plantes intéressantes pour le département :*

- *Chrysosplenium oppositifolium* : La Chausserie à Saint-Mesmin, abondant à un niveau rocheux en bordure du ruisseau de la Fontaine de Montbail (S.B.).



- *Fumaria densiflora* : deux pieds en bordure de chemin, près du marais de l'Ilià à l'île d'Yeu (C.B.).

- *Hedypnois cretica* : très abondant pelouse sablonneuse en bordure de route, entre les Demoiselles et le Petit Bec à Saint-Hilaire-de-Riez (P.D.). Nouveau pour la Vendée où pourrait s'étendre dangereusement.

- *Lagarosiphon major* : dans deux étangs à la Petite Nourie à Poiroux, deux plans d'eau près du ruisseau du Gué Chatenay à Sorin, à Talmont-Saint-Hilaire (C.S.P.). Nouveau pour la Vendée armoricaine.

- *Omphalodes verna* : naturalisé au bois de la Vergne à Saint-Hilaire-des-Loges et en forêt domaniale de Mervent, à l'est du rond-point Saint-Luc (Ph. R.). Nouveau pour la Vendée.

**Observations de :** S. B. : Stéphane Barbier, C.B. : Claude Bugeon, D.C. : Daniel Chicouène, C.S.P. : Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Vendée, E.D. : Eliane Déat, P.D. : P. Dupont, M.G. : Michel Godreau, H.G. : Hervé Guillet, Ph.R. : Philippe Rouiller, A.T. : Alain Thomas, J.P.T. : Jean-Paul Tilly, Th.Y. : Théophile You.



*Paris quadrifolia*

(dessin et carte de répartition extraits de J.C. Rameau et al., 1989 – Flore forestière française. 1 Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier, Ministère de l'Agriculture et de la Forêt)