


DECEMBRE 2015

MESNAGE Cécile

# Actualisation de la liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (Version 2) et établissement d'une liste de messicoles prioritaires pour la région





# Actualisation de la liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (Version 2) et établissement d'une liste de messicoles prioritaires pour la région

2015

## Rédaction :

MESNAGE Cécile – Conservatoire botanique national de Brest

## Avec le soutien financier de:

DREAL des Pays de la Loire

## Selecture et avis :

LACROIX Pascal

## Photographie de couverture :

CBN de Brest (Jean-Claude ABADIE)

## Ce document doit être référencé comme suit :

MESNAGE C., 2015 – *Actualisation de la liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (Version 2) et établissement d'une liste de messicoles prioritaires pour la région.* DREAL des Pays de la Loire. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest, 28 p. + annexe

## Sommaire

|   |    |
|---|----|
| PREAMBULE .....   | 1  |
| I. ACTUALISATION DE LA LISTE REGIONALE DES PLANTES MESSICOLES ..  | 1  |
| 1. Evolution de la liste principale des messicoles .....  | 1  |
| 2. Evolution de l'annexe à la liste principale (taxons à confirmer) .....   | 2  |
| II. ETABLISSEMENT D'UNE LISTE DE MESSICOLES PRIORITAIRES POUR LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE .....  | 20 |
| BIBLIOGRAPHIE .....   | 27 |
| ANNEXE 1 : LISTE DES PLANTES MESSICOLES EN PAYS DE LA LOIRE ET LEUR COTATION SUR LA LISTE ROUGE REGIONALE DE 2015 (DORTEL <i>ET AL.</i> , 2015) ..... | 28 |

## PREAMBULE

Ce travail s'inscrit dans le cadre du Plan national d'actions en faveur des messicoles et fait suite à l'élaboration en 2013 d'une liste régionale et d'un état des lieux des plantes messicoles en Pays de la Loire (Vallet *et al.*, 2013).

## I. ACTUALISATION DE LA LISTE REGIONALE DES PLANTES MESSICOLES

Plusieurs modifications ont été apportées à la 1<sup>ère</sup> version de la liste régionale des plantes messicoles et son annexe qui regroupe les taxons pour lesquels il est difficile de statuer en l'état des connaissances sur leur comportement messicole (Vallet *et al.*, 2013). Elles intègrent en particulier l'évolution du catalogue régional de la flore vasculaire. L'important travail de dépouillement bibliographique réalisé dans le cadre de l'atlas du Maine-et-Loire (Geslin *et al.*, 2015) a en outre permis la mise en évidence de deux taxons messicoles qui n'avaient pas été pris en compte.

Nous proposons ainsi une version 2 de la liste régionale des plantes messicoles (tableau 1) ainsi que de son annexe (tableau 2).

Les noms français des plantes sont donnés dans cette nouvelle version.

### 1. Evolution de la liste principale des messicoles

#### 1.1. Ajouts

Deux taxons cités anciennement en Maine-et-Loire et aujourd'hui présumés disparus ont été ajoutés à la liste :

- **la Gagée des prés, *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort.**, taxon cité historiquement en Maine-et-Loire dans quelques rares secteurs sablonneux de la vallée de la Loire (presqu'exclusivement sur les îles). A manifestement été observé pour la dernière fois par G. Bouvet à Saint-Jean-de-la-Croix en 1891.
- **la Renouée de Bellard, *Polygonum bellardii* All.** Ce taxon figure sur la liste nationale des messicoles. Les mentions anciennes du Maine-et-Loire l'indiquent comme un taxon rare : « rare selon Boreau (1859), était signalé dans quelques terrains calcaires du Beaugeois et du Saumurois. Dernières observations faites sans doute par Piron (1980) à Courchamps, Distré et Montfort » (Geslin *et al.*, 2015).

#### 1.2. Retraits

Deux taxons ont été retirés de la liste :

- le Trèfle raide, *Trifolium strictum* L. En effet, après réexamen des sources bibliographiques et en l'état des connaissances régionales, il s'avère que ce taxon n'est pas lié principalement aux cultures mais plutôt à un habitat de pelouse,

- l’Ervilier, *Vicia ervilia* (L.) Willd., ce taxon est désigné dans le catalogue de la flore vasculaire de l’Ouest de la France (<http://www.cbnbreast.fr/site/html/botaniste/outils.html#cat>), comme non indigène en Pays de la Loire. Ce statut d’indigénat écarte donc le taxon de la liste car selon la méthode définie initialement, seuls les taxons indigènes sont pris en compte (hormis ceux non indigènes figurant sur la liste nationale des messicoles).

### 1.3. Précisions, modifications

Dans cette version 2 de la liste, il est précisé un comportement messicole plus marqué par le passé pour la Cotonnière de France, *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. En effet, cette acidiphile fréquente aujourd’hui plutôt les pelouses ouvertes, même si on la rencontre encore parfois dans les cultures et friches.

De plus, *Vicia villosa* Roth, 1793 a été remplacé par ses déclinaisons au rang de la sous espèce :

- La Vesce velue, *Vicia villosa* Roth subsp. *villosa*,
- La Vesce variable, *Vicia villosa* Roth subsp. *varia* (Host) Corb. qui figuraient initialement dans l’annexe.

Ces 2 taxons ne figurent pas en tant que tels sur la liste nationale, seul le rang spécifique (*Vicia villosa* Roth,) étant intégré. Toutefois pour plus de cohérence nous considérons qu’ils viennent en remplacement. *Vicia villosa* Roth subsp. *villosa* est non indigène en Pays de la Loire et est donc pris en compte, en respect de la méthode d’élaboration de la liste régionale de 2013, au titre du PNA. S’agissant de *Vicia villosa* Roth subsp. *varia* (Host) Corb., assimilé indigène en Pays de la Loire, également pris en compte au titre du PNA, son comportement messicole reste à préciser.

La liste régionale des messicoles ainsi actualisée compte 130 taxons, dont 14 ne répondent pas aux critères de messicole en Pays de la Loire mais figurent sur la liste car appartenant à la liste nationale (en respect de la méthode préconisée par le PNA pour l’élaboration des listes régionales).

## 2. Evolution de l’annexe à la liste principale (taxons à confirmer)

Le Podosperme lacinié, *Scorzonera laciniata* L. et la Véronique mate, *Veronica opaca* Fr. ont été retirés de l’annexe à la liste régionale des plantes messicoles. Le premier car d’après les récentes connaissances de terrain on peut conclure que l’habitat principal de ce taxon n’est pas les cultures mais plutôt les lieux secs, les friches ; et quant au second, il semble qu’il soit absent de la région. Donné comme exceptionnel en France selon *Flora gallica*, nous ne disposons pour la région que d’une seule donnée de Piron en Maine-et-Loire qui pourrait provenir d’une confusion avec *V. agrestis*.

**Tableau 1 : Liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (VERSION 2)**

Le cas échéant est précisé :

- si le taxon est retenu dans le cadre du PNA même s'il ne répond pas aux critères de plante messicole au niveau régional (« Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire »). *Les taxons correspondants sont repérés en couleur grise*,
- si le taxon est plutôt lié aux vignes qu'aux moissons (« Vigne »),
- si le taxon n'a un comportement de messicole que sur une partie du territoire régional (« Entité biogéographique »),
- si l'habitat principal n'est plus aujourd'hui les cultures mais l'était par le passé (« Comportement messicole plus marqué par le passé »).

Les modifications apportées par rapport à la version 1 (2013) sont repérées en surlignage vert pour les ajouts, mauve pour les modifications apportées.

\* Référentiel des noms d'usage de la flore de l'Ouest de la France (R.N.F.O.), Geslin et al., 2010,

\*\* Selon PNA Messicoles (Cambecèdes et al., 2012)

| Nom RNFO*                    | Nom Taxref (V7)                      | Noms français**       | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI: Non indigène<br>?: indigénat incertain<br>NR: non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--------|---|---|-------------|
| Achnos arvensis (Lam.) Dandy | Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 | Petit basilic         | I  |  |        |   | X   |             |
| Adonis aestivalis L.         | Adonis aestivalis L., 1762           | Adonis d'été          | -  |  |        |   |   |             |
| Adonis annua L. subsp. annua | Adonis annua L., 1753                | Adonis d'automne      | -  |  |        |   |   |             |
| Adonis flammea Jacq.         | Adonis flammea Jacq., 1776           | Adonis couleur de Feu | -  |  |        |   |   |             |
| Aethusa cynapium L.          | Aethusa cynapium L., 1753            | Petite ciguë          | -  |  |        |   |   |             |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref (V7)   | Noms français**     | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement de messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---|-------------|
| Agrostemma githago L.                                | <i>Agrostemma githago</i> L., 1753                        | Nielle des blés     | —  |  |   |  |   |             |
| Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.<br>subsp. chamaepitys | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773               | Bugle petit-pin     | —  |  |   |  |   |             |
| Alopecurus myosuroides Huds.                         | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762                 | Vulpin des champs   | —  |  |   |  |   |             |
| Althaea hirsuta L.                                   | <i>Malva setigera</i> Spenn., 1829                        | Guimauve hérissee   | —  |  |   |  |   |             |
| Ammi majus L. subsp. majus                           | <i>Ammi majus</i> L., 1753                                | Grand ammi          | —  |  |   |  |   |             |
| Anagallis foemina Mill.                              | <i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 | Mouron bleu         | —  |  |   |  |   |             |
| Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.<br>subsp. arvensis     | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753                         | Buglosse des champs | —  |  |   |  |   |             |
| Anchusa azurea Mill.                                 | <i>Anchusa italica</i> Retz., 1779                        | Buglosse d'Italie   | —  |  |   | X  |   |             |
| Androsace maxima L.                                  | <i>Androsace maxima</i> L., 1753                          | Grande androsace    | —  |  |   |  |   |             |
| Anthemis arvensis L. subsp.<br>arvensis              | <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753                         | Anthémis des champs | —  |  |   |  |   |             |
| Anthemis cotula L.                                   | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753                           | Camomille puante    | —  |  |   |  |   |             |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref (V7)  | Noms français**                 | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI : Non indigène<br>? : indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|-------------|
| <i>Anthemis mixta</i> L.   | <i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827   | Anthémis panaché                | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.<br>subsp. <i>spica-venti</i>  | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812   | Jouet-du-vent                   | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Aphanes arvensis</i> L.   | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753   | Alchémille des champs           | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg.<br>& Körte  | <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811                                   | Dormeuse (Porcelle des moutons) | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl<br>subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | Avoine à chapelets              | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Asperula arvensis</i> L.  | <i>Asperula arvensis</i> L., 1753  | Aspérule des champs             | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Avena fatua</i> L.  | <i>Avena fatua</i> L., 1753  | Avoine folle                    | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Avena sterilis</i> L. subsp.<br><i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman   | <i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman, 1882                   | Avoine de Ludovic               | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Bifora radians</i> M.Bieb.  | <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819  | Bifora rayonnante               | NI  | non indigène                                     |   |   |   |             |
| <i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.   | <i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng., 1820   | Bifora testiculé                | -   |  |   |   |   |             |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref (V7)                                 | Noms français**                | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|--|---|--------------------------------|--|--|--------|---|---|-------------|
| <i>Briza minor</i> L.                              | <i>Briza minor</i> L., 1753                     | Petite anourette               | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Bromus arvensis</i> L.                          | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753                 | Brome des champs               | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i> | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753                | Brome faux-seigle              | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Bunias erucago</i> L.                           | <i>Bunias erucago</i> L., 1753                  | Bunias fausse-roquette         | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Bupleurum rotundifolium</i> L.                  | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753         | Bupleure à feuilles rondes     | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.         | <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.      | Bupleure à feuilles lancéolées | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Calendula arvensis</i> L.                       | <i>Calendula arvensis</i> L., 1763              | Souci des champs               | -  |  | X      |   |   |             |
| <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.          | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905 | Calépine                       | -  |  |        |   |   |             |
| <i>Camellina alyssum</i> (Mill.) Thell.            | <i>Camellina alyssum</i> (Mill.) Thell., 1906   | Caméligne alysson              | NI   | non indigène                                     |        |   |   |             |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref (V7)                                | Noms français**                              | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | Commentaire  |
|---|--|--|--|--|--------|---|---|--|
| Camelina microcarpa Andrz. ex DC.                         | <i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC., 1821 | Camélaine à petits fruits                    | NR   | non indigène ?                                   |        |   |   | Présence actuelle sur le territoire non attestée. Seule citation pour le Massif armoricain : flore de des Abbaye et al 'signalé comme adventice actuel dans les cultures de lin et les décombrés.' |
| Camelina sativa (L.) Crantz                               | <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762       | Camélaine cultivée                           | NI   | non indigène                                     |        |   |   |  |
| <i>Caucalis platycarpos</i> L.                            | <i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753           | Caucalis à fruits aplatis                    | -  |  |        |   |   |  |
| <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762               | Bleuet                                       | -  |  |        |   |   |  |
| <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i> | <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870    | Petite linnaire                              | -  |  |        |   | X   |  |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> L.                           | <i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869     | Marguerite dorée (Chrysanthème des moissons) | -  |  |        |   |   |  |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref (V7)                                    | Noms français**            | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI : Non indigène<br>? : indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|---|--|----------------------------|---|--|--------|---|---|-------------|
| <i>Corringia orientalis</i> (L.) Dumort.  | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1827     | Roquette d'Orient          | NI  | non indigène                                     |        |   |   |             |
| <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur  | <i>Delphinium ajacis</i> L., 1753                  | Pied-d'alouette d'Ajax     | I   |  |        |   |   |             |
| <i>Consolida regalis</i> S.F.Gray subsp. <i>regalis</i>                               | <i>Delphinium consolida</i> L., 1753               | Pied-d'alouette royal      | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch  | <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837 | Queue de scorpion          | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Crepis pulchra</i> L.  | <i>Crepis pulchra</i> L., 1753                     | Crépis élégant             | -   |  | X      |   |   |             |
| <i>Cuscuta epithymum</i> Weihe  | <i>Cuscuta epithymum</i> Weihe, 1824               | Cuscute du lin             | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Delphinium halteratum</i> Sm. subsp. <i>verdunense</i> (Balb.) Graebn. & P.Graebn. | <i>Delphinium verdunense</i> Balb., 1813           | Pied-d'alouette de Bresse  | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.  | <i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC., 1821           | Diplotaxis des vignes      | -   |  | X      |   |   |             |
| <i>Euphorbia exigua</i> L.  | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753                   | Euphorbe fluette           | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Euphorbia falcata</i> L.   | <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753                  | Euphorbe en faux           | -   |  |        |   |   |             |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> L.  | <i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753             | Euphorbe à larges feuilles | -   |  |        |   |   |             |

| Nom RNFO*                                      | Nom Taxref (V7)   | Noms français**               | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI: Non indigène<br>?: indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes   | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire           |
|--|---|-------------------------------|---|--|----------|---|---|-----------------------|
| <i>Filago pyramidata</i> L.                    | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753                             | Cotonnière spatulée           | -   |  |          |   |   |                       |
| <i>Fumaria densiflora</i> DC.                  | <i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813                           | Fumeterre à fleurs denses     | -   |  |          |   | X   |                       |
| <i>Fumaria parviflora</i> Lam.                 | <i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788                          | Fumeterre à petites fleurs    | -   |  |          |   | X   |                       |
| <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.              | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809                       | Fumeterre de Vaillant         | -   |  |          |   | X   |                       |
| <i>Gagea arvensis</i> (Pers.) Dumort.          | <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826                    | Gagée des champs              | -   |  |          |   |   |                       |
| <b><i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.</b>  | <b><i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827</b>           | <b>Gagée des prés</b>         | <b>-</b>  | <b>Gagée des prés</b>                            | <b>-</b> | <b>Gagée des prés</b>   | <b>-</b>  | <b>Gagée des prés</b> |
| <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.  | <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804           | Galéopsis à feuilles étroites | -   |  |          |   |   |                       |
| <i>Galeopsis segetum</i> Neck.                 | <i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770                          | Galéopsis des moissons        | -   |  |          |   | X   |                       |
| <i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i> | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm., 1846 | Gaillet bâtarde               | -   |  |          |   |   |                       |
| <i>Galium tricornutum</i> Dandy                | <i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957                         | Gaillet à trois cornes        | -   |  |          |   |   |                       |
| <i>Gladiolus italicus</i> Mill.                | <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768                         | Glâieul d'Italie              | -   |  |          |   |   |                       |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref (V7)                                   | Noms français**            | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|---|---|----------------------------|--|--|---|---|---|-------------|
| <i>Holosteum umbellatum</i> L.<br>subsp. <i>umbellatum</i>          | <i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753              | Holostée en ombelle        | -  | -  | X   | X   | X   |             |
| <i>Hypecoum pendulum</i> L.   | <i>Hypecoum pendulum</i> L., 1753                 | Cumin pendant              | ?  |  |   |   |   |             |
| <i>Iberis amara</i> L. subsp. <i>amara</i>                          | <i>Iberis amara</i> L., 1753                      | Ibéris amer                | -  |  |   |   |   |             |
| <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.<br>subsp. <i>elatine</i>        | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827         | Linaire élatine            | -  |  |   |   |   |             |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.<br>subsp. <i>spuria</i>          | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827          | Linaire bâtarde            | -  |  |   |   |   |             |
| <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.)<br>Dumort. subsp. <i>squarrosa</i> | <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827    | Bardanette                 | -  |  | X   |   |   |             |
| <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.                                    | <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783            | Gesse à graines sphériques | -  |  |   | X   |   |             |
| <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre                               | <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800       | Spéculaire hybride         | -  |  |   |   |   |             |
| <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.)<br>Chaix                      | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | Miroir de Vénus            | -  |  |   |   |   |             |
| <i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.                                  | <i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799          | Linaire des champs         | -  |  |   | X   |   |             |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref (V7)   | Noms français**       | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement de messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé         | commentaire |
|--|---|-----------------------|--|--|---|--|---|-------------|
| <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.   | <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768                              | Linaire de Pélassier  | -  |  | Bassins sédimentaires   |  |   |             |
| <i>Lithospermum arvense</i> L.   | <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954                       | Grémil des champs     | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub  | <i>Filago arvensis</i> L., 1753   | Cotonnière des champs | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.                                       | <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843                            | Cotonnière de France  | -  |  |   | X  | Acidiphile au caractère messicole plus marqué autrefois |             |
| <i>Lolium remotum</i> Schrank  | <i>Lolium remotum</i> Schrank, 1789                                       | Ivraie du lin         | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Lolium temulentum</i> L.  | <i>Lolium temulentum</i> L., 1753   | Ivraie enivrante      | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Matricaria recutita</i> L.  | <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753                                     | Matricaire camomille  | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.  | <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840                                 | Muflier des champs    | -  |  |   |  |   |             |
| <i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. subsp. <i>lelievrei</i> (Bureau) K.Richt. | <i>Muscari botryoides</i> subsp. <i>lelievrei</i> (Bureau) K.Richt., 1890 | Muscari de Lelièvre   | -  |  | X   |  |   |             |

| Nom RNFO*                                      | Nom Taxref (V7)  | Noms français**                            | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI : Non indigène<br>? : indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement de messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|--|--|--|---|--|---|--|---|-------------|
| Muscari neglectum / racemosum                  | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842             | Muscari à grappe                           | -   |  | X   |  |   |             |
| Myagrum perfoliatum L.                         | <i>Myagrum perfoliatum</i> L., 1753                      | Myagre perfolié                            | -   |  |   |  |   |             |
| Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. paniculata | <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.<br>subsp. paniculata | Neslie paniculée                           | NI  | non indigène                                     |   |  |   |             |
| Nigella arvensis L. subsp. arvensis            | <i>Nigella arvensis</i> L., 1753                         | Nigelle des champs                         | -   |  |   |  |   |             |
| Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.                 | <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814              | Orlaya à grandes fleurs                    | -   |  |   |  |   |             |
| Ornithogalum divergens Boreau                  | <i>Ornithogalum divergens</i> Boreau, 1857               | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures | -   |  | X   |  |   |             |
| Ornithogalum umbellatum L.                     | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753                  | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures | -   |  |   | X  |   |             |
| Papaver argemone L.                            | <i>Papaver argemone</i> L., 1753                         | Coquelicot argémone                        | -   |  |   |  |   |             |
| Papaver dubium L. subsp. dubium                | <i>Papaver dubium</i> L. subsp.<br><i>dubium</i>         | Coquelicot douteux                         | -   |  |   |  | X   |             |
| Papaver hybridum L.                            | <i>Papaver hybridum</i> L., 1753                         | Coquelicot intermédiaire                   | -   |  |   |  |   |             |

| Nom RNFO*                                       | Nom Taxref (V7)                 | Noms français**      | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|-------------|
| Papaver rhoes L.                                | Papaver rhoes L., 1753          | Grand coquelicot     | -  |  |   |   |   |             |
| Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch            | Sison segetum L., 1753          | Persil des moissons  | -  |  |   | X   |   |             |
| Physalis alkekengi L.                           | Physalis alkekengi L., 1753     | Coqueret             | IV   |  | X   |   |   |             |
| Polycnemum arvense L.                           | Polycnemum arvense L., 1753     | Polycnème des champs | -  |  |   |   |   |             |
| Polycnemum majus A.Braun                        | Polycnemum majus A.Braun, 1841  | Grand polycnème      | -  |  |   |   |   |             |
| Polygonum bellardii All.                        | Polygonum bellardii All., 1785  | Renouée de Bellard   | -  |  |   |   |   |             |
| Ranunculus arvensis L.                          | Ranunculus arvensis L., 1753    | Renoncule des champs | -  |  |   |   |   |             |
| Roemeria hybrida (L.) DC.                       | Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | Roemérie hybride     | -  |  |   |   |   |             |
| Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris | Scandix pecten-veneris L., 1753 | Peigne de Vénus      | -  |  |   |   |   |             |

| Nom RNFO*                              | Nom Taxref (V7)                              | Noms français**          | Indigénat (synthèse régionale) : Indigène NI ; Non indigène ? ; indigénat incertain NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes       | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire   |
|--|--|--------------------------|--|--|--------------|---|---|---|
| Scleranthus annuus L. subsp. annuus    | Scleranthus annuus L.<br>subsp. annuus       | Scléranthe annuel        | — X  |  |              |   |   | Largement lié à d'autres milieux que les cultures en Pays de la Loire |
| Silene cretica L.                      | Silene cretica L., 1753                      | Silène de Crête          | NI   | non indigène                                     |              |   |   |   |
| Silene gallica L.                      | Silene gallica L., 1753                      | Silène de France         | —  | NI   | non indigène |   | X   |   |
| Sinapis alba L. subsp. alba            | Sinapis alba L., 1753                        | Moutarde blanche         |  | NI   | non indigène |   |   |   |
| Spergula arvensis L. subsp. arvensis   | Spergula arvensis L., 1753                   | Spergule des champs      | —  |  |              |   |   |   |
| Spergularia segetalis (L.) G.Don       | Spergularia segetalis (L.) Vill., 1789       | Spergulaire des moissons | —  |  |              |   |   |   |
| Stachys annua (L.) L.                  | Stachys annua (L.) L., 1763                  | Epiaire annuelle         | —  |  |              |   |   |   |
| Stachys arvensis (L.) L.               | Stachys arvensis (L.) L., 1763               | Epiaire des champs       | —  |  |              |   |   |   |
| Teucrium botrys L.                     | Teucrium botrys L., 1753                     | Germandrée botryde       | —  |  |              |   | X   |   |
| Thlaspi arvense L.                     | Thlaspi arvense L., 1753                     | Tabouret des champs      | —  |  |              |   |   |   |
| Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. | Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 | Passerine des champs     | —  |  |              |   |   |   |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref (V7)  | Noms français**               | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI : Non indigène<br>? : indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire |
|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|-------------|
|  |  |                               |   |  |   |   |   |             |
| <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> | <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>                                     | Tulipe sauvage                | -   | -  | X   |   | X   |             |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.                | <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814  | Caucalis à larges feuilles    | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert          | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965  | Vachère                       | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.                | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805  | Mâche couronnée               | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich             | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>dentata</i>  | Mâche dentée                  | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Valerianella rimosa</i> Bastard                   | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>rimosa</i> (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 | Mâche à oreillettes           | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Veronica acinifolia</i> L.                        | <i>Veronica acinifolia</i> L., 1762  | Véronique à feuilles d'acinos | -   |  | X   |   |   |             |
| <i>Veronica praecox</i> All.                         | <i>Veronica praecox</i> All., 1789   | Véronique précoce             | -   |  |   |   | X   |             |
| <i>Veronica triphylllos</i> L.                       | <i>Veronica triphylllos</i> L., 1753   | Véronique à trois feuilles    | -   |  |   |   |   |             |
| <i>Vicia articulata</i> Hornem.                      | <i>Vicia articulata</i> Hornem., 1813  | Vesce articulée               | NI  | non indigène                                     |   |   |   |             |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref (V7)                       | Noms français**                  | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI : Non indigène<br>? : indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Vignes de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement de messicole plus marqué par le passé | Comportement messicole plus marqué par le passé | commentaire  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| <i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M.Bieb.) Nyman | <i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769   | Vesce de Hongrie                 | NI  | non indigène                                     |   |  |   |  |
| <i>Vicia peregrina</i> L.   | <i>Vicia peregrina</i> L., 1753       | Vesce voyageuse                  | I   |  |   |  |   |  |
| <i>Vicia serratifolia</i> Jacq.                                     | <i>Vicia serratifolia</i> Jacq., 1778 | Vesce à feuilles dentées en scie | AI  |  |   |  |   |  |
| <i>Vicia tenuifolia</i> Roth  | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788    | Vesce à feuilles étroites        | I   |  |   |  |   |  |
| <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.          | <i>Vicia dasycarpa</i> Ten., 1829     | Vesce variable                   | AI  | caractère messicole à préciser en PdL            |   |  |   | Taxon intégré à la liste (était en annexe), en remplacement du taxon qui était présent au rang spécifique. |
| <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>                     | <i>Vicia villosa</i> Roth, 1793       | Vesce velue                      | NI  | non indigène                                     |   |  |   |  |
| <i>Viola arvensis</i> Murray  | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770    | Pensée des champs                | I   |  |   |  |   |  |
| <i>Viola tricolor</i> L.  | <i>Viola tricolor</i> L., 1753        | Pensée tricolore                 | I   |  |   |  |   |  |

**Tableau 2 : Annexe à la liste régionale des plantes messicoles (Taxons à confirmer). VERSION 2**

\* Référentiel des noms d'usage de la flore de l'Ouest de la France (R.N.F.O.), Geslin et al., 2010,

\*\* Selon PNA Messicoles (Cambécèdes et al., 2012)

| Nom RNFO*                                | Nom Taxref V7                               | Noms français**                                | Lacune dans la connaissance                    | Commentaire                             |
|--|---|--|--|---|
| Allium paniculatum L. subsp. paniculatum | Allium longispathum D.Delaroché             | Ail en panicule                                | —<br>taxonomie<br>habitat principal à préciser | des confusions avec <i>A. oleraceum</i> |
| Allium polyanthum Schult. & Schult.f.    | Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 | Ail à nombreuses fleurs,<br>Poireau des vignes | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Anthoxanthum aristatum Boiss.            | Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842         | Flouve aristée                                 | —<br>messicole sur le Bassin parisien ?        |   |
| Falcaria vulgaris Bernh.                 | Falcaria vulgaris Bernh., 1800              | Falcaire                                       | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Filago lutescens Jord. subsp. lutescens  | Filago lutescens Jord., 1846                | Cotonnière jaunâtre                            | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Filago vulgaris Lam.                     | Filago germanica L., 1763                   | Cotonnière d'Allemagne                         | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Fumaria bastardii Boreau                 | Fumaria bastardii Boreau, 1847              | Fumeterre de Bastard                           | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Galeopsis ladanum L.                     | Galeopsis ladanum L., 1753                  | -  | —<br>habitat principal à préciser              |   |
| Galeopsis bifida Boenn.                  | Galeopsis bifida Boenn., 1824               | Galéopsis bifide                               | —<br>habitat principal à préciser              |   |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7   | Noms français**      | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI: Non indigène<br>?: indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Lacune dans la connaissance  | Commentaire           |
|---|---|----------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| <i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.           | <i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913           | Gastridie            | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L. subsp. <i>amplexicaule</i>        | <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753                                   | Lamier amplexicaule  | -   | espèce rudérale ?            |                       |
| <i>Lathyrus aphaca</i> L.                                       | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753                                       | Gesse aphylle        | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Lathyrus hirsutus</i> L.                                     | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753                                     | Gesse hérisnée       | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Lathyrus nissolia</i> L.                                     | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753                                     | Gesse sans vrière    | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> L.                                    | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753                                    | Macusson             | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>              | <i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811                                    | Ivraie à épis serrés | -   | Taxon rudéral ?              | Taxon présumé disparu |
| <i>Melampyrum arvense</i> L.                                    | <i>Melampyrum arvense</i> L., 1753                                    | Mélampyre des champs | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme   | <i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme, 1863      | Cocquelicot de Lecoq | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link                            | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821                            | Torilis des champs   | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.                             | <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809                             | Mâche à fruits velus | -   | habitat principal à préciser |                       |
| <i>Valerianella muricata</i> (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter | <i>Valerianella muricata</i> (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter, 1839 | Mâche muriquée       | -   | Taxon rudéral ?              |                       |


| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7               | Noms français**    | Indigénat (synthèse régionale)<br>I: Indigène<br>NI: Non indigène<br>?: indigénat incertain<br>NR : non renseigné | Lacune dans la connaissance  | Commentaire  |
|---|-----------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| Veronica agrestis L.  | Veronica agrestis L., 1753  | Véronique agreste  | -   | Taxon rudéral ?<br>Taxonomie | des confusions avec des formes de <i>V. polita</i> |
| Veronica polita Fr.   | Veronica polita Fr., 1819   | Véronique luisante | -   | habitat principal à préciser |  |
| Vicia lutea L. subsp. lutea                                     | Vicia lutea L., 1753        | Vesce jaune        | -   | habitat principal à préciser |  |
| Vicia tetrasperma (L.) Schreb.<br>subsp. gracilis (DC.) Hook.f. | Vicia parviflora Cav., 1801 | Vesce grêle        | -   | habitat principal à préciser |  |

## II. ETABLISSEMENT D'UNE LISTE DE MESSICOLES PRIORITAIRES POUR LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

La liste actualisée des plantes messicoles en Pays de la Loire a été croisée avec la récente liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire, établie selon la méthodologie et la démarche de l'IUCN (Dortel *et al.*, 2015). La cotation de chacun des taxons de la liste des messicoles est présentée dans la liste fournie en annexe et illustrée sur la figure 1 ci-dessous.

**Figure 1 : Taxons de la liste des messicoles en Pays de la Loire et leur cotation sur la liste rouge régionale de 2015 (Dortel *et al.*, 2015)**

RE : taxon présumé disparu, CR\* : Taxon en danger critique, peut être disparue, CR : Taxon en danger critique, EN : Taxon en danger, VU : Taxon vulnérable, NT : Taxon quasi-menacé, LC : Taxon de préoccupation mineure, DD : Taxon dont les données sont déficientes



Plus de 50% des taxons de la liste régionale des messicoles sont évalués comme taxons menacés. Près de 20% correspondent à des taxons qui sont présumés disparus de la région et sont à rechercher pour certains d'entre eux (toutes les stations connues n'ont pas fait l'objet de prospections récentes systématiques) : taxons cotés en CR\* (*Bifora testiculata* (L.) Spreng., *Bupleurum rotundifolium* L., *Caucalis platycarpos* L., *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J.Koch et *Physalis alkekengi* L.).

Une liste des plantes messicoles prioritaires pour la région a été établie sur la base de cette cotation (tableau 3). Ont été retenus les taxons présumés disparus non revus récemment (catégories RE et CR\*), les taxons évalués comme menacés (catégories CR, EN et VU) et les taxons évalués comme à surveiller (catégorie NT).

**Cette liste compte 76 taxons, soit 58 % de la liste totale des messicoles.**

Tableau 3 : Liste des messicoles prioritaires en Pays de la Loire

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7   | Noms français**           | Cotation UICN 2015 | Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire | Lié aux vignes | Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique) | Comportement messicole plus marqué par le passé |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|----------------|---|---|
| <i>Adonis aestivalis</i> L.   | <i>Adonis aestivalis</i> L., 1762                             | Adonis d'été              | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Androsace maxima</i> L.  | <i>Androsace maxima</i> L., 1753                              | Grande androsace          | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Asperula arvensis</i> L.   | <i>Asperula arvensis</i> L., 1753                             | Aspérule des champs       | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Bunias erucago</i> L.  | <i>Bunias erucago</i> L., 1753                                | Bunias fausse-roquette    | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe   | <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe, 1824                           | Cuscute du lin            | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Delphinium halteratum</i> Sm. subsp. <i>verdunense</i> (Balb.) Graebn. & P.Graebn. | <i>Delphinium verdunense</i> Balb., 1813                      | Pied-d'alouette de Bresse | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.  | <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827                  | Gagée des prés            | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i>  | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm., 1846 | Gaillet bâtard            | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. subsp. <i>squarrosa</i>                      | <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827                | Bardanette                | RE                 |  | X              |   |   |
| <i>Lolium remotum</i> Schrank   | <i>Lolium remotum</i> Schrank, 1789                           | Ivraie du lin             | RE                 |  |                |   |   |
| <i>Lolium temulentum</i> L.   | <i>Lolium temulentum</i> L., 1753                             | Ivraie envirante          | RE                 |  |                |   |   |

|  |  |                                |     |  |   |  |   |
|--|--|--------------------------------|-----|--|---|--|---|
| <i>Myagrum perfoliatum</i> L.                | <i>Myagrum perfoliatum</i> L., 1753                | Myagre perfolié                | RE  |  |   |  |   |
| <i>Polycnemum arvense</i> L.                 | <i>Polycnemum arvense</i> L., 1753                 | Polycnème des champs           | RE  |  |   |  |   |
| <i>Polycnemum majus</i> A.Braun              | <i>Polycnemum majus</i> A.Braun, 1841              | Grand polycnème                | RE  |  |   |  |   |
| <i>Polygonum bellardii</i> All.              | <i>Polygonum bellardii</i> All., 1785              | Renouée de Bellard             | RE  |  |   |  |   |
| <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.             | <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., 1821             | Roemérie hybride               | RE  |  |   |  |   |
| <i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don      | <i>Spergula segetalis</i> (L.) Vill., 1789         | Spergulaire des moissons       | RE  |  |   |  |   |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.        | <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814        | Caucalis à larges feuilles     | RE  |  |   |  |   |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.        | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805        | Mâche couronnée                | RE  |  |   |  |   |
| <i>Vicia peregrina</i> L.                    | <i>Vicia peregrina</i> L., 1753                    | Vesce voyageuse                | RE  |  |   |  |   |
| <i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.       | <i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng., 1820       | Bifora testiculé               | CR* |  |   |  |   |
| <i>Bupleurum rotundifolium</i> L.            | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753            | Buplèvre à feuilles rondes     | CR* |  |   |  |   |
| <i>Caucalis platycarpos</i> L.               | <i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753               | Caucalis à fruits aplatis      | CR* |  |   |  |   |
| <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch | <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837 | Queues de scorpion             | CR* |  |   |  |   |
| <i>Physalis alkekengi</i> L.                 | <i>Physalis alkekengi</i> L., 1753                 | Coqueret                       | CR* |  | X |  |   |
| <i>Anchusa azurea</i> Mill.                  | <i>Anchusa italicica</i> Retz., 1779               | Buglosse d'Italie              | CR  |  |   |  | X |
| <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.   | <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.         | Buplèvre à feuilles lancéolées | CR  |  |   |  |   |

|   |   |                                  |    |  |   |  |   |
|---|---|----------------------------------|----|--|---|--|---|
| <i>Consolida regalis</i><br>S.F.Gray subsp.<br><i>regalis</i> | <i>Delphinium<br/>consolida</i> L.,<br>1753                   | Pied-<br>d'alouette<br>royal     | CR |  |   |  |   |
| <i>Diplotaxis viminea</i><br>(L.) DC.                         | <i>Diplotaxis<br/>viminea</i> (L.)<br>DC., 1821               | Diplotaxis<br>des vignes         | CR |  | X |  |   |
| <i>Fumaria parviflora</i><br>Lam.                             | <i>Fumaria<br/>parviflora</i> Lam.,<br>1788                   | Fumeterre<br>à petites<br>fleurs | CR |  |   |  | X |
| <i>Fumaria vaillantii</i><br>Loisel.                          | <i>Fumaria<br/>vaillantii</i> Loisel.,<br>1809                | Fumeterre<br>de Vaillant         | CR |  |   |  | X |
| <i>Galium tricornutum</i><br>Dandy                            | <i>Galium<br/>tricornutum</i><br>Dandy, 1957                  | Gaillet à<br>trois<br>cornes     | CR |  |   |  |   |
| <i>Gladiolus italicus</i><br>Mill.                            | <i>Gladiolus<br/>italicus</i> Mill.,<br>1768                  | Glaïeul<br>d'Italie              | CR |  |   |  |   |
| <i>Iberis amara</i> L.<br>subsp. <i>amara</i>                 | <i>Iberis amara</i> L.,<br>1753                               | Ibéris<br>amer                   | CR |  |   |  |   |
| <i>Legousia hybrida</i><br>(L.) Delarb're                     | <i>Legousia<br/>hybrida</i> (L.)<br>Delarb're, 1800           | Spéculaire<br>hybride            | CR |  |   |  |   |
| <i>Linaria arvensis</i> (L.)<br>Desf.                         | <i>Linaria arvensis</i><br>(L.) Desf., 1799                   | Linaire des<br>champs            | CR |  |   |  | X |
| <i>Logfia arvensis</i> (L.)<br>Holub                          | <i>Filago arvensis</i><br>L., 1753                            | Cotonnièr<br>e des<br>champs     | CR |  |   |  |   |
| <i>Nigella arvensis</i> L.<br>subsp. <i>arvensis</i>          | <i>Nigella arvensis</i><br>L., 1753                           | Nigelle des<br>champs            | CR |  |   |  |   |
| <i>Thymelaea<br/>passerina</i> (L.) Coss.<br>& Germ.          | <i>Thymelaea<br/>passerina</i> (L.)<br>Coss. & Germ.,<br>1861 | Passerine<br>des<br>champs       | CR |  |   |  |   |
| <i>Veronica triphyllos</i><br>L.                              | <i>Veronica<br/>triphylllos</i> L.,<br>1753                   | Véronique<br>à trois<br>feuilles | CR |  |   |  |   |
| <i>Adonis flammea</i><br>Jacq.                                | <i>Adonis<br/>flammea</i> Jacq.,<br>1776                      | Adonis<br>couleur de<br>Feu      | EN |  |   |  |   |
| <i>Agrostemma<br/>githago</i> L.                              | <i>Agrostemma<br/>githago</i> L., 1753                        | Nielle des<br>blés               | EN |  |   |  |   |
| <i>Euphorbia falcata</i> L.                                   | <i>Euphorbia<br/>falcata</i> L., 1753                         | Euphorbe<br>en faux              | EN |  |   |  |   |
| <i>Fumaria densiflora</i><br>DC.                              | <i>Fumaria<br/>densiflora</i> DC.,<br>1813                    | Fumeterre<br>à fleurs<br>denses  | EN |  |   |  |   |

|   |  |                                  |    |  |   |                       |   |
|---|--|----------------------------------|----|--|---|-----------------------|---|
| <i>Gagea arvensis</i><br>(Pers.) Dumort.  | <i>Gagea villosa</i><br>(M.Bieb.) Sweet, 1826                                      | Gagée des champs                 | EN |  |   |                       |   |
| <i>Linaria pelisseriana</i><br>(L.) Mill.   | <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768                                       | Linaire de Péliſſier             | EN |  |   | Bassins sédimentaires |   |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich  | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>dentata</i>                                      | Mâche dentée                     | EN |  |   |                       |   |
| <i>Vicia serratifolia</i><br>Jacq.  | <i>Vicia serratifolia</i><br>Jacq., 1778   | Vesce à feuilles dentées en scie | EN |  |   |                       |   |
| <i>Veronica praecox</i><br>All.   | <i>Veronica praecox</i> All., 1789   | Véronique précoce                | EN |  |   |                       | x |
| <i>Adonis annua</i> L.<br>subsp. <i>annua</i>   | <i>Adonis annua</i> L., 1753   | Adonis d'automne                 | VU |  |   |                       |   |
| <i>Holosteum umbellatum</i> L.<br>subsp. <i>umbellatum</i>                              | <i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753   | Holostée en ombelle              | VU |  | x |                       | x |
| <i>Lathyrus sphaericus</i><br>Retz.   | <i>Lathyrus sphaericus</i><br>Retz., 1783  | Gesse à graines sphériques       | VU |  |   |                       | x |
| <i>Muscari botryoides</i><br>(L.) Mill. subsp.<br><i>lelievrei</i> (Bureau)<br>K.Richt. | <i>Muscari botryoides</i><br>subsp. <i>lelievrei</i><br>(Bureau)<br>K.Richt., 1890 | Muscari de Lelièvre              | VU |  | x |                       | x |
| <i>Orlaya grandiflora</i><br>(L.) Hoffm.  | <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814  | Orlaya à grandes fleurs          | VU |  |   |                       |   |
| <i>Papaver hybridum</i><br>L.   | <i>Papaver hybridum</i> L., 1753   | Coquelicot intermédiaire         | VU |  |   |                       |   |
| <i>Teucrium botrys</i> L.   | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753  | Germandrée botryde               | VU |  |   |                       | x |
| <i>Vaccaria hispanica</i><br>(Mill.) Rauschert  | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965                                  | Vachère                          | VU |  |   |                       |   |
| <i>Ajuga chamaepitys</i><br>(L.) Schreb. subsp.<br><i>chamaepitys</i>                   | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773  | Bugle petit-pin                  | NT |  |   |                       |   |
| <i>Anthemis arvensis</i><br>L. subsp. <i>arvensis</i>                                   | <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753  | Anthémis des champs              | NT |  |   |                       |   |

|   |  |  |    |  |   |                       |   |
|---|--|--|----|--|---|-----------------------|---|
| <i>Anthemis cotula</i> L.                                     | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753                      | Camomille puante                             | NT |  |   |                       |   |
| <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte                | <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | Dormeuse (Porcelle des moutons)              | NT |  |   | Bassins sédimentaires | X |
| <i>Briza minor</i> L.   | <i>Briza minor</i> L., 1753                          | Petite amourette                             | NT |  |   |                       |   |
| <i>Bromus arvensis</i> L.                                     | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753                      | Brome des champs                             | NT |  |   |                       |   |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> L.                               | <i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869           | Marguerite dorée (Chrysanthème des moissons) | NT |  |   |                       |   |
| <i>Crepis pulchra</i> L.                                      | <i>Crepis pulchra</i> L., 1753                       | Crépis élégant                               | NT |  | X |                       |   |
| <i>Filago pyramidata</i> L.                                   | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753                    | Cotonnière spatulée                          | NT |  |   |                       |   |
| <i>Galeopsis segetum</i> Neck.                                | <i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770                 | Galéopsis des moissons                       | NT |  |   |                       | X |
| <i>Lithospermum arvense</i> L.                                | <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954  | Grémil des champs                            | NT |  |   |                       |   |
| <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.                      | <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843       | Cotonnière de France                         | NT |  |   |                       | X |
| <i>Papaver argemone</i> L.                                    | <i>Papaver argemone</i> L., 1753                     | Coquelicot argémone                          | NT |  |   |                       |   |
| <i>Ranunculus arvensis</i> L.                                 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753                  | Renoncule des champs                         | NT |  |   |                       |   |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i> | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753               | Peigne de Vénus                              | NT |  |   |                       |   |
| <i>Stachys annua</i> (L.) L.                                  | <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763                   | Epiaire annuelle                             | NT |  |   |                       |   |
| <i>Thlaspi arvense</i> L.                                     | <i>Thlaspi arvense</i> L., 1753                      | Tabouret des champs                          | NT |  |   |                       |   |
| <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>          | <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> | Tulipe sauvage                               | NT |  | X |                       | X |

|                                |  |                        |    |  |  |  |
|--------------------------------|--|------------------------|----|--|--|--|
| Valerianella rimosa<br>Bastard | Valerianella<br>dentata f.<br>rimosa<br>(Bastard)<br>Devesa, J.López<br>& R.Gonzalo,<br>2005 | Mâche à<br>oreillettes | NT |  |  |  |
|--------------------------------|--|------------------------|----|--|--|--|

\* Référentiel des noms d'usage de la flore de l'Ouest de la France (R.N.F.O.), Geslin *et al.*, 2010

\*\* Selon PNA Messicoles Annexe 1 (Cambecèdes *et al.*, 2012)

| Catégories de menace (IUCN) |  |
|-----------------------------|--|
| RE                          | Taxon présumé disparu                      |
| CR*                         | Taxon en danger critique peut être disparu |
| CR                          | Taxon en danger critique                   |
| EN                          | Taxon en danger                            |
| VU                          | Taxon vulnérable                           |
| NT                          | Taxon quasi menacé                         |

## BIBLIOGRAPHIE

CAMBECEDES J., LARGIER G., LOMBARD A. (2012) - *Plan national d'actions en faveur des plantes messicoles*. Fédération des Conservatoires botaniques nationaux / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bagnères-de-Bigorre : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 242 p.

DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 - *Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'IUCN : Document validé par l'IUCN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015*. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes

GESLIN J. (coord.), LACROIX P. (coord.), 2015 - *Atlas de la flore de Maine-et-Loire. Flore vasculaire*. Conseil régional des Pays de la Loire / Conseil général du Maine-et-Loire / FEDER / DREAL Pays-de-la-Loire. Turriers : Naturalia Publications, 608 p.

VALLET J., MESNAGE C., RAMBAUD M., LACROIX P., 2013 - *Etablissement d'une liste régionale et état des lieux des plantes messicoles en Pays de la Loire : contribution à la déclinaison régionale du plan national d'actions en faveur des messicoles*. DREAL Pays-de-la-Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest / Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 27 p., annexes.

**ANNEXE 1 : LISTE DES PLANTES MESSICOLES EN PAYS DE LA LOIRE ET LEUR  
COTATION SUR LA LISTE ROUGE REGIONALE DE 2015 (DORTEL ET AL., 2015)**

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7  | Noms français**                 | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |                                 |                                     |
| <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy   | <i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891  | Petit basilic                   | LC                                  |
| <i>Adonis aestivalis</i> L.   | <i>Adonis aestivalis</i> L., 1762  | Adonis d'été                    | RE                                  |
| <i>Adonis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>  | <i>Adonis annua</i> L., 1753   | Adonis d'automne                | VU                                  |
| <i>Adonis flammea</i> Jacq.   | <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776  | Adonis couleur de Feu           | EN                                  |
| <i>Aethusa cynapium</i> L.  | <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753   | Petite ciguë                    | LC                                  |
| <i>Agrostemma githago</i> L.  | <i>Agrostemma githago</i> L., 1753   | Nielle des blés                 | EN                                  |
| <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>chamaepitys</i>   | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773  | Bugle petit-pin                 | NT                                  |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.   | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762  | Vulpin des champs               | LC                                  |
| <i>Althaea hirsuta</i> L.   | <i>Malva setigera</i> Spenn., 1829   | Guimauve hérissée               | LC                                  |
| <i>Ammi majus</i> L. subsp. <i>majus</i>  | <i>Ammi majus</i> L., 1753   | Grand ammi                      | LC                                  |
| <i>Anagallis foemina</i> Mill.  | <i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009                              | Mouron bleu                     | LC                                  |
| <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb. subsp. <i>arvensis</i>   | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753  | Buglosse des champs             | LC                                  |
| <i>Anchusa azurea</i> Mill.   | <i>Anchusa italicica</i> Retz., 1779   | Buglosse d'Italie               | CR                                  |
| <i>Androsace maxima</i> L.  | <i>Androsace maxima</i> L., 1753   | Grande androsace                | RE                                  |
| <i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>  | <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753  | Anthémis des champs             | NT                                  |
| <i>Anthemis cotula</i> L.   | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753  | Camomille puante                | NT                                  |
| <i>Anthemis mixta</i> L.  | <i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827   | Anthémis panaché                | LC                                  |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>spica-venti</i>  | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812   | Jouet-du-vent                   | LC                                  |
| <i>Aphanes arvensis</i> L.  | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753   | Alchémille des champs           | LC                                  |
| <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte  | <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811                                   | Dormeuse (Porcelle des moutons) | NT                                  |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | Avoine à chapelets              | LC                                  |
| <i>Asperula arvensis</i> L.   | <i>Asperula arvensis</i> L., 1753  | Aspérule des champs             | RE                                  |
| <i>Avena fatua</i> L.   | <i>Avena fatua</i> L., 1753  | Avoine folle                    | LC                                  |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7  | Noms français**                              | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman | Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman, 1882 | Avoine de Ludovic                            | LC                                  |
| Bifora radians M.Bieb.                              | Bifora radians M.Bieb., 1819                           | Bifora rayonnante                            | NA                                  |
| Bifora testiculata (L.) Spreng.                     | Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820                  | Bifora testiculé                             | CR*                                 |
| Briza minor L.                                      | Briza minor L., 1753                                   | Petite amourette                             | NT                                  |
| Bromus arvensis L.                                  | Bromus arvensis L., 1753                               | Brome des champs                             | NT                                  |
| Bromus secalinus L. subsp. secalinus                | Bromus secalinus L., 1753                              | Brome faux-seigle                            | DD                                  |
| Bunias erucago L.                                   | Bunias erucago L., 1753                                | Bunias fausse-roquette                       | RE                                  |
| Bupleurum rotundifolium L.                          | Bupleurum rotundifolium L., 1753                       | Buplèvre à feuilles rondes                   | CR*                                 |
| Bupleurum subovatum Link ex Spreng.                 | Bupleurum subovatum Link ex Spreng.                    | Buplèvre à feuilles lancéolées               | CR                                  |
| Calendula arvensis L.                               | Calendula arvensis L., 1763                            | Souci des champs                             | LC                                  |
| Calepina irregularis (Asso) Thell.                  | Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905               | Calépine                                     | LC                                  |
| Camelina alyssum (Mill.) Thell.                     | Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906                  | Caméline alysson                             | NA                                  |
| Camelina microcarpa Andrz. ex DC.                   | Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821                | Caméline à petits fruits                     | NA                                  |
| Camelina sativa (L.) Crantz                         | Camelina sativa (L.) Crantz, 1762                      | Caméline cultivée                            | NA                                  |
| Caucalis platycarpos L.                             | Caucalis platycarpos L., 1753                          | Caucalis à fruits aplatis                    | CR*                                 |
| Centaurea cyanus L.                                 | Cyanus segetum Hill, 1762                              | Bleuet                                       | LC                                  |
| Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus         | Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870                   | Petite linaire                               | LC                                  |
| Chrysanthemum segetum L.                            | Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869                    | Marguerite dorée (Chrysanthème des moissons) | NT                                  |
| Conringia orientalis (L.) Dumort.                   | Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827                | Roquette d'Orient                            | NA                                  |
| Consolida ajacis (L.) Schur                         | Delphinium ajacis L., 1753                             | Pied-d'alouette d'Ajax                       | DD                                  |
| Consolida regalis S.F.Gray subsp. regalis           | Delphinium consolida L., 1753                          | Pied-d'alouette royal                        | CR                                  |
| Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch               | Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837            | Queues de scorpion                           | CR*                                 |
| Crepis pulchra L.                                   | Crepis pulchra L., 1753                                | Crépis élégant                               | NT                                  |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7   | Noms français**               | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|   |   |                               |                                     |
| <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe   | <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe, 1824                           | Cuscute du lin                | RE                                  |
| <i>Delphinium halteratum</i> Sm. subsp. <i>verdunense</i> (Balb.) Graebn. & P.Graebn. | <i>Delphinium verdunense</i> Balb., 1813                      | Pied-d'alouette de Bresse     | RE                                  |
| <i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.  | <i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC., 1821                      | Diplotaxis des vignes         | CR                                  |
| <i>Euphorbia exigua</i> L.  | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753                              | Euphorbe fluette              | LC                                  |
| <i>Euphorbia falcata</i> L.   | <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753                             | Euphorbe en faux              | EN                                  |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> L.  | <i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753                        | Euphorbe à larges feuilles    | LC                                  |
| <i>Filago pyramidata</i> L.   | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753                             | Cotonnière spatulée           | NT                                  |
| <i>Fumaria densiflora</i> DC.   | <i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813                           | Fumeterre à fleurs denses     | EN                                  |
| <i>Fumaria parviflora</i> Lam.  | <i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788                          | Fumeterre à petites fleurs    | CR                                  |
| <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.   | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809                       | Fumeterre de Vaillant         | CR                                  |
| <i>Gagea arvensis</i> (Pers.) Dumort.   | <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826                    | Gagée des champs              | EN                                  |
| <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.  | <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827                  | Gagée des prés                | RE                                  |
| <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.   | <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804           | Galéopsis à feuilles étroites | DD                                  |
| <i>Galeopsis segetum</i> Neck.  | <i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770                          | Galéopsis des moissons        | NT                                  |
| <i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i>  | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm., 1846 | Gaillet bâtarde               | RE                                  |
| <i>Galium tricornutum</i> Dandy   | <i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957                         | Gaillet à trois cornes        | CR                                  |
| <i>Gladiolus italicus</i> Mill.   | <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768                         | Glaïeul d'Italie              | CR                                  |
| <i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>                               | <i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753                          | Holostée en ombelle           | VU                                  |
| <i>Hypecoum pendulum</i> L.   | <i>Hypecoum pendulum</i> L., 1753                             | Cumin pendant                 | NA                                  |
| <i>Iberis amara</i> L. subsp. <i>amara</i>  | <i>Iberis amara</i> L., 1753                                  | Ibéris amer                   | CR                                  |
| <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>                             | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827                     | Linaire élatine               | LC                                  |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort. subsp. <i>spuria</i>                               | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827                      | Linaire bâtarde               | LC                                  |
| <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. subsp. <i>squarrosa</i>                      | <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827                | Bardanette                    | RE                                  |
| <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.  | <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783                        | Gesse à graines sphériques    | VU                                  |

| Nom RNFO*  | Nom Taxref V7   | Noms français**                            | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Legousia hybrida (L.) Delarbre                                   | Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800                        | Spéculaire hybride                         | CR                                  |
| Legousia speculum-veneris (L.) Chaix                             | Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785                  | Miroir de Vénus                            | LC                                  |
| Linaria arvensis (L.) Desf.                                      | Linaria arvensis (L.) Desf., 1799                           | Linaire des champs                         | CR                                  |
| Linaria pelisseriana (L.) Mill.                                  | Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768                       | Linaire de Pélissier                       | EN                                  |
| Lithospermum arvense L.  | Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954                | Grémil des champs                          | NT                                  |
| Logfia arvensis (L.) Holub                                       | Filago arvensis L., 1753                                    | Cotonnière des champs                      | CR                                  |
| Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.                                | Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843                     | Cotonnière de France                       | NT                                  |
| Lolium remotum Schrank   | Lolium remotum Schrank, 1789                                | Ivraie du lin                              | RE                                  |
| Lolium temulentum L.   | Lolium temulentum L., 1753                                  | Ivraie enivrante                           | RE                                  |
| Matricaria recutita L.   | Matricaria chamomilla L., 1753                              | Matricaire camomille                       | LC                                  |
| Misopates orontium (L.) Rafin.                                   | Misopates orontium (L.) Raf., 1840                          | Muflier des champs                         | LC                                  |
| Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. lelievrei (Bureau) K.Richt. | Muscari botryoides subsp. lelievrei (Bureau) K.Richt., 1890 | Muscari de Lelièvre                        | VU                                  |
| Muscari neglectum / racemosum                                    | Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842                       | Muscari à grappe                           | LC                                  |
| Myagrum perfoliatum L.   | Myagrum perfoliatum L., 1753                                | Myagre perfolié                            | RE                                  |
| Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. paniculata                   | Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. paniculata              | Neslie paniculée                           | NA                                  |
| Nigella arvensis L. subsp. arvensis                              | Nigella arvensis L., 1753                                   | Nigelle des champs                         | CR                                  |
| Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.                                   | Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814                        | Orlaya à grandes fleurs                    | VU                                  |
| Ornithogalum divergens Bureau                                    | Ornithogalum divergens Bureau, 1857                         | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures | LC                                  |
| Ornithogalum umbellatum L.                                       | Ornithogalum umbellatum L., 1753                            | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures | LC                                  |
| Papaver argemone L.  | Papaver argemone L., 1753                                   | Coquelicot argémone                        | NT                                  |
| Papaver dubium L. subsp. dubium                                  | Papaver dubium L. subsp. dubium                             | Coquelicot douteux                         | LC                                  |
| Papaver hybridum L.  | Papaver hybridum L., 1753                                   | Coquelicot intermédiaire                   | VU                                  |
| Papaver rhoeas L.  | Papaver rhoeas L., 1753                                     | Grand coquelicot                           | LC                                  |
| Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch                             | Sison segetum L., 1753                                      | Persil des moissons                        | LC                                  |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7  | Noms français**               | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |                               |                                     |
| <i>Physalis alkekengi</i> L.                                  | <i>Physalis alkekengi</i> L., 1753   | Coqueret                      | CR*                                 |
| <i>Polycnemum arvense</i> L.                                  | <i>Polycnemum arvense</i> L., 1753   | Polycnème des champs          | RE                                  |
| <i>Polycnemum majus</i> A.Braun                               | <i>Polycnemum majus</i> A.Braun, 1841  | Grand polycnème               | RE                                  |
| <i>Polygonum bellardii</i> All.                               | <i>Polygonum bellardii</i> All., 1785  | Renouée de Bellard            | RE                                  |
| <i>Ranunculus arvensis</i> L.                                 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753  | Renoncule des champs          | NT                                  |
| <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.                              | <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., 1821   | Roemérie hybride              | RE                                  |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i> | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753   | Peigne de Vénus               | NT                                  |
| <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>             | <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>  | Scléranthe annuel             | LC                                  |
| <i>Silene cretica</i> L.                                      | <i>Silene cretica</i> L., 1753   | Silène de Crête               | NA                                  |
| <i>Silene gallica</i> L.                                      | <i>Silene gallica</i> L., 1753   | Silène de France              | LC                                  |
| <i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>                     | <i>Sinapis alba</i> L., 1753   | Moutarde blanche              | NA                                  |
| <i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>            | <i>Spergula arvensis</i> L., 1753  | Spergule des champs           | LC                                  |
| <i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don                       | <i>Spergularia segetalis</i> (L.) Vill., 1789  | Spergulaire des moissons      | RE                                  |
| <i>Stachys annua</i> (L.) L.                                  | <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763   | Epiaire annuelle              | NT                                  |
| <i>Stachys arvensis</i> (L.) L.                               | <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763  | Epiaire des champs            | LC                                  |
| <i>Teucrium botrys</i> L.                                     | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753  | Germandrée botryde            | VU                                  |
| <i>Thlaspi arvense</i> L.                                     | <i>Thlaspi arvense</i> L., 1753  | Tabouret des champs           | NT                                  |
| <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.                 | <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861                                      | Passerine des champs          | CR                                  |
| <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>          | <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>                                     | Tulipe sauvage                | NT                                  |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.                         | <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814  | Caucalis à larges feuilles    | RE                                  |
| <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert                   | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965  | Vachère                       | VU                                  |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.                         | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805  | Mâche couronnée               | RE                                  |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich                      | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>dentata</i>  | Mâche dentée                  | EN                                  |
| <i>Valerianella rimosa</i> Bastard                            | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>rimosa</i> (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 | Mâche à oreillettes           | NT                                  |
| <i>Veronica acinifolia</i> L.                                 | <i>Veronica acinifolia</i> L., 1762  | Véronique à feuilles d'acinos | LC                                  |
| <i>Veronica praecox</i> All.                                  | <i>Veronica praecox</i> All., 1789   | Véronique précoce             | EN                                  |

| Nom RNFO*   | Nom Taxref V7                  | Noms français**                  | Cotation<br>Liste rouge<br>PdL 2015 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Veronica triphylllos L.                               | Veronica triphylllos L., 1753  | Véronique à trois feuilles       | CR                                  |
| Vicia articulata Hornem.                              | Vicia articulata Hornem., 1813 | Vesce articulée                  | NA                                  |
| Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M.Bieb.) Nyman | Vicia pannonica Crantz, 1769   | Vesce de Hongrie                 | NA                                  |
| Vicia peregrina L.                                    | Vicia peregrina L., 1753       | Vesce voyageuse                  | RE                                  |
| Vicia serratifolia Jacq.                              | Vicia serratifolia Jacq., 1778 | Vesce à feuilles dentées en scie | EN                                  |
| Vicia tenuifolia Roth                                 | Vicia tenuifolia Roth, 1788    | Vesce à feuilles étroites        | LC                                  |
| Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.          | Vicia dasycarpa Ten., 1829     | Vesce variable                   | DD                                  |
| Vicia villosa Roth subsp. villosa                     | Vicia villosa Roth, 1793       | Vesce velue                      | NA                                  |
| Viola arvensis Murray                                 | Viola arvensis Murray, 1770    | Pensée des champs                | LC                                  |
| Viola tricolor L.                                     | Viola tricolor L., 1753        | Pensée tricolore                 | LC                                  |

| Catégories de menace (IUCN) |  |
|-----------------------------|--|
| RE                          | Taxon disparu au niveau régional           |
| CR*                         | Taxon en danger critique peut être disparu |
| CR                          | Taxon en danger critique                   |
| EN                          | Taxon en danger                            |
| VU                          | Taxon vulnérable                           |
| NT                          | Taxon quasi menacé                         |
| LC                          | Taxon de préoccupation mineure             |
| DD                          | Taxon dont les données sont déficientes    |
| NA                          | <i>Taxon non évaluable</i>                 |



## Résumé

La liste des messicoles et son annexe (taxons à confirmer) établies en 2013 pour les Pays de la Loire dans le cadre du PNA « Messicoles », sont actualisées sur la base des nouveaux éléments de connaissance disponibles.

Une liste des plantes messicoles prioritaires pour la région est élaborée sur la base du croisement de la liste régionale des messicoles avec la récente liste rouge régionale de la flore vasculaire (2015).

**Mots-clés :** messicoles, liste rouge, Pays de la Loire, PNA « Messicoles »



web | [www.cbnbrest.fr](http://www.cbnbrest.fr)

Syndicat mixte qui regroupe Brest métropole océane,  
Conseil général du Finistère, Conseil régional de Bretagne  
et Université de Bretagne Occidentale.

## Conservatoire botanique national de Brest

Siège, service international,  
jardin, service éducatif,  
et antenne Bretagne  
52 allée du Bot  
29 200 BREST  
02 98 41 88 95  
cbn.brest@cbnbrest.com

Antenne Basse-Normandie  
Parc estuaire entreprises  
Rte de Caen  
14 310 VILLERS-BOCAGE  
02 31 96 77 56  
cbn.bassenormandie@cbnbrest.com

Antenne Pays de la Loire  
28<sup>me</sup> rue Babonneau  
44 100 NANTES  
02 40 69 70 55  
cbn.paysdeloire@cbnbrest.com